

## **Крок M Лікувальна справа**

*Дисципліни хірургічного профілю*

**1**

Через падіння з драбини пацієнт отримав черепно-мозкову травму, непритомний, періодично виникає блювання. У неврологічному статусі визначаються менінгеальні симптоми. Як потрібно транспортувати пацієнта:

- A** У горизонтальному положенні на ношах, повернути голову хворого на бік
- B** У положенні сидячи
- C** У горизонтальному положенні лежачи на животі
- D** У горизонтальному положенні на м'якій поверхні, повернути голову хворого на бік
- E** У горизонтальному положенні, фіксувавши кінцівки лонгетами

**2**

Постраждалому перед транспортуванням до лікарні наклали джгут, але термін накладання закінчився раніше госпіталізації. Що робити з потерпілим?

- A** \*Джгут послабити, кровотечу спинити пальцевим притисканням, після відновлення кровообігу в кінцівці знову накласти джгут
- B** Продовжити транспортування з накладеним джгутом
- C** Джгут зняти, накласти давлючу пов'язку
- D** Джгут зняти, ввести кровоспинні засоби
- E** Ввести серцеві і продовжити транспортування

**3**

Жінка М., 24 років звернулась на ФАП зі скаргами на біль в лівій половині грудної клітки, який виник після травми. Біль посилюється при кашлі, рухах. Під час огляду в ділянці 4 – 5 ребер зліва відмічається гематома, набряк м'яких тканин та відставання грудної клітки в акті дихання. При пальпації в ділянці 4 – 5 ребер різка болючість, відчувається хrust.

Визначте діагноз:

- A** Забій грудної клітки, перелом 4 – 5 ребер
- B** Стиснення грудної клітки
- C** Перелом грудини
- D** Перелом ключиці
- E** Струс грудної клітки

**4**

Чоловік П., 42 роки звернувся на ФАП зі скаргами на біль, деформацію і порушення функції правої кінцівки після падіння на витягнуту руку. При обстеженні: рука знаходиться у відведеному положенні, пошкоджене плече опущене, хворий тримає руку зігнутою в лікті, передпліччя підтримує здоровою рукою. Під дзьобоподібним відростком пальпується вивихнута голівка. Визначте діагноз:

- A** Вивих правого плеча
- B** Перелом плечової кістки
- C** Забій плечового суглоба
- D** Розтягнення зв'язок плечового суглоба
- E** Перелом акроміального відростка лопатки

**5**

Жінка Л., 73 роки звернулася на ФАП зі скаргами на біль в порожнині рота, особливо при прийомі їжі, втрату смаку їжі, неприємний запах з рота. При огляді: гіперемія, набряк слизової оболонки, невеликі кровоточиві виразки з нерівними краями на яснах. Визначте діагноз:

- A** Стоматит
- B** Гінгівіт
- C** Червоний плоский лишай
- D** Лейкоплакія
- E** Нома

**6**

Чоловік С., 51 рік звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відмічаються жовтувато-блілі крапки розміром з головку шпильки. Визначте діагноз:

- A** Фолікулярна ангіна
- B** Катаральна ангіна
- C** Лакунарна ангіна
- D** Дифтерія глотки
- E** Виразково-плівчаста ангіна

**7**

Хвора 40 років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на різке почервоніння, закисання правого ока, що з'явилось сьогодні вранці після сну. Об'єктивно: слизова оболонка повік та очного яблука різко гіперемійована, набрякла, багато гнійного виділення. Поставте діагноз.

- A** \*Гострий кон'юнктивіт правого ока
- B** Гострий приступ глаукоми
- C** Хронічний дакріоцистит
- D** Герпетичний деревовидний кератит
- E** Міопія середнього ступеню

**8**

Ви фельдшер швидкої допомоги. Виклик до хворого на рак гортані зі скаргами на затруднене дихання, нестачу повітря. При огляді дихання свистяче, акраціаноз, PS-96 за 1хв. Пацієнт займає вимушене сидяче положення. Ваші дії

- A** \*Дати кисень, терміново госпіталізувати
- B** Провести інтубацію трахеї
- C** Ввести роторозширювач
- D** Ввести повітровід
- E** Ввести серцеві препарати

**9**

До фельдшера здоров пункту звернулася жінка 32 років, зі скаргами на появу бородавчастого утворення на лівій щоці, яке легко травмується і кровоточить. Консультацію якого фахівця потребує хвора ?

- A** \*Онколога
- B** Дерматолога
- C** Хірурга
- D** Травматолога
- E** Терапевта

**10**

На ФАП з вулиці доставлено чоловіка 45 років без свідомості. При огляді: обличчя в крові, у тім'яній ділянці рана, що кровоточить. При обережній пальпації відчуваються краї кісткових відломків. У рані стирчить кістка. Вкажіть попередній діагноз:

- A** Відкрита черепно-мозкова травма
- B** Закрита черепно-мозкова травма
- C** Перелом основи черепа
- D** Стиснення головного мозку
- E** Забій голови

**11**

Пацієнту готовують до ургентної операції . За призначенням лікаря Вам необхідно підготувати препарати для премедикації. Який препарат є обов'язковим для її проведення ?

- A** Атропін

- B** Аналгін
- C** Аміназин
- D** Клофелін
- E** Листенон

12

Чоловік випадково випив 100 мл метилового спирту. Через 2 години відчув нудоту, головний біль, блімання в очах, наростаючу спрагу. Було блювання. Слизові оболонки гіперемійовані, з ціанотичним відтінком, зіниці розширені. Який антидот Ви застосуєте?

- A** Етиловий спирт
- B** Вікасол
- C** Магнію оксид
- D** Атропіну сульфат
- E** Унітіол

13

Після купання у ставку у пацієнта з'явилася слізотеча, різі в очах, закисання очей. А вранці не зміг розплющити очі через склеювання вій. Для якого захворювання це характерно?

- A** Кон'юктивіт
- B** Блефарит
- C** Дакріоцистит
- D** Виразка рогівки
- E** Катаракта

14

До фельдшера звернувся пацієнт зі скаргами на затуманення зору, райдужні кола при погляді на джерело світла, нудоту. Яке обстеження повинен провести фельдшер для встановлення діагнозу?

- A** Вимірювання внутрішньо очного тиску
- B** Визначення світовідчуття
- C** Дослідження поля зору
- D** Визначення рефракції
- E** Дослідження гостроти зору

15

До вас звернулась хвора зі скаргами на періодичні запаморочення, порушення рівноваги. Ви запідоцірили у неї лабіrintит. Лабіrintит – це запалення:

- A** Внутрішнього вуха
- B** Середнього вуха
- C** Зовнішнього вуха
- D** Соскоподібного відростка
- E** Слухової труби

16

Для якого захворювання характерний симптомокомплекс: біль в оці, світлобоязнь, слізотеча, перикориальна ін'екція, наявність інфільтрату на рогівці?

- A** Кератит
- B** Склерит
- C** Іридоцикліт
- D** Хоріоідит
- E** Кон'юктивіт

17

Фельдшер запідоцірив у пацієнта двосторонній гайморит. Які допоміжні методи обстеження слід провести для встановлення діагнозу?

- A** Рентгенографія навколоносових пазух
- B** Флюорографія органів грудної порожнини
- C** Фарингоскопія
- D** Отоскопія
- E** Ларингоскопія

18

Фельдшер ФАПу надає допомогу при відкритому переломі кісток гомілки з артеріальною кровотечею. Яка послідовність дій?

- A** Зупинка кровотечі, знеболювання, асептична пов'язка, іммобілізація
- B** Пов'язка, зупинка кровотечі, іммобілізація, знеболювання
- C** Іммобілізація, пов'язка, зупинка кровотечі, знеболювання
- D** Пов'язка, іммобілізація, зупинка кровотечі, знеболювання
- E** Іммобілізація, зупинка кровотечі, пов'язка, знеболювання

19

На медпункт заводу звернувся хворий зі скаргами на безпричинну слабкість, апатію, схуднення, відразу до м'ясної їжі, наявність домішок слизу у калі. На Вашу думку, це:

- A** Симптоми "малих ознак" злюкісної пухлини
- B** Симптоми розпаду пухлини
- C** Симптоми "плюс тканини"
- D** Симптоми передракових станів
- E** Безсимптомний період онкохвороб

20

До Вас на ФАП звернулася пацієнта 47-ми років зі скаргою на появу утягнутості соска правої молочної залози. Про яку хворобу найімовірніше свідчить даний симптом?

- A** Рак молочної залози?
- B** Мастопатія?
- C** Хронічний мастит?
- D** Аденома молочної залози?
- E** Екзема ареоли та соска молочної залози?

21

До Вас звернувся хворий зі скаргами на слізотечу. Під час обстеження Ви виявили гіперемію кон'юнктиви, випинання у нижньо - внутрішньому куті орбіти, при натисканні на яке із нижньої слізної крапки виділяється гній. Яка проблема у хворого?

- A** Дакріоцистит
- B** Кератит
- C** Блефарит
- D** Дакріаденіт
- E** Кон'юнктивіт

22

Хворому I – 56р показано провести оперативне втручання на органах черевної порожнини під ендотрахеальним наркозом. Що потрібно приготувати для інкубації трахеї ?

- A** \*Ларингоскоп, ендотрахеальні трубки, електровідсмоктувач
- B** Шпателі, рото розширювач, зонд Блекмора
- C** Роторозширювач, розширювач трахеї Трусссо, трахеостомічні трубки
- D** Катетер Фолея,венозний джгут, с-подібний повітропровід
- E** Корнцанг, затискач Більрота, термометр

23

До Вас звернувся хворий з циркулярною гіповою пов'язкою вранці і скаржиться на сильні болі в нозі. При огляді – синюшність, набряк пальців, знижена чутливість пальців. Що Ви повинні зробити як фельдшер ?

- A** \*Розрізати гіпсову лонгету вздовж, розвести краї, фіксувати бинтом, направити до травматолога  
**B** Зняти гіпсову лонгету  
**C** Провести знеболення  
**D** Обробити шкіру пальців йодонатом  
**E** Надати кінцівці підвищене положення

24

Хворий 52-х років скаржиться на сильний пульсуючий біль у правому вусі, який посилюється при жуванні. Об'єктивно:  $t^0 37,1^0C$ , слух у нормі, при натисканні на козлик різко збільшується інтенсивність болю у вусі. Це симптоми:

- A** Фурункулу зовнішнього слухового проходу  
**B** Середнього катарального отиту  
**C** Перехондриту вушної раковини  
**D** Середнього гнійного отиту  
**E** Дифузного гнійного лабиринту

25

Ви фельдшер здоровпункту. На здоровпункт звернулась хвора 40 років зі скаргами на наявність ущільнення в лівій молочній залозі. Об-но: В верхньо-зовнішньому квадраті лівої молочної залози пальпується пухлина біля 3-х см в діаметрі, не болюча, без чітких контурів, підпахові лімфовузли не збільшені, шкіра над пухлиною не змінена. Ваша тактика?

- A** \* Направити до онколога  
**B** Направити в фіз кабінет  
**C** Порекомендувати масаж молочної залози  
**D** Призначити антибіотики  
**E** Накласти зігріваючий компрес

26

Які повинні бути кордони транспортної іммобілізації у потерпілих при переломі плечової кістки?

- A** \* Пальці – лопатка здорової сторони  
**B** Зап'ястя – лопатка здорової сторони  
**C** Кисть - лопатка здорової сторони  
**D** Передпліччя – плече здорової сторони  
**E** Кисть – плечовий суглоб

27

Ви працюєте на фельдшерсько-акушерському пункті. До Вас звернувся пацієнт зі скаргами. Після обстеження пацієнта Ви встановили діагноз: Закритокутова глаукома. Гострий приступ глаукоми. Оберіть групу препаратів, що використовують для лікування закритокутової глаукоми.

- A** \*Міотики  
**B** Гормональні препарати  
**C** Антибіотики  
**D** Мідріатики  
**E** Вітамінні краплі

28

Ви працюєте фельдшером ФАПу, під час огляду у хворого 55 років з ішемічною хворобою серця раптово розвинулась клінічна смерть. Які ознаки характерні для клінічної смерті?

- A** \* Відсутність пульсу на сонній або стегновій артерії, розширення зіниць, припинення дихання  
**B** Відсутність пульсу на променевій артерії, звуження зіниць  
**C** Ослаблене дихання з частотою 5-8 за 1 хв.  
**D** Бурхливе дихання з частотою понад 40 за 1 хв.

## **E** Рожевий відтінок шкіри

**29**

Які прилади необхідні для вимірювання внутрішнього тиску на ФАПі при глаукомі?

- A** \* Тонометр Маклакова
- B** Офтальмометр
- C** Периметр
- D** Щелева лампа
- E** Гоніоскоп

**30**

Ви фельдшер швидкої допомоги. У потерпілого в ДТП діагностовано відкритий перелом плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги ?

- A** \* Джгут, знеболити, пов'язка, шина
- B** Джгут, шина, знеболити, пов'язка
- C** Знеболити, пов'язка, джгут, шина
- D** Пов'язка, знеболити, джгут, шина
- E** Шина, знеболити, джгут, пов'язка

**31**

На Фап звернувся чоловік, який під час бійки отримав перелом нижньої щелепи. Яка найбільш доцільна іммобілізуюча пов'язка в даному випадку?

- A** \*“Вуздечка”
- B** Біноокулярна
- C** Поворотна
- D** Хрестоподібна
- E** Чепець

**32**

Ви фельдшер швидкої допомоги прибули на виклик. При огляді потерпілого з колотою раною грудної клітки виявлено, що в момент видиху повітря заходить зі свистом у плевральну порожнину, а при вдиху – краї рани злипаються. Прогресивне погіршення загального стану. Яке ускладнення найбільш вірогідне в даному випадку?

- A** \* Клапаний пневмоторакс
- B** Відкритий пневмоторакс
- C** Закритий пневмоторакс
- D** Стиснення грудної клітки
- E** Змішаний пневмоторакс

**33**

Чоловік Д., 48 років, отримав травму грудної клітки. Турбують болі у правій половині грудної клітки, задишка, утруднення дихання. Фельдшер швидкої допомоги діагностував перелом VI ребра. Як потрібно транспортувати потерпілого?

- A** \*В напівсидячому положенні
- B** Лежачи на боці
- C** Лежачи на спині
- D** Лежачи на животі
- E** Сидячи

**34**

На уроці фізкультури учень 9 класу отримав перелом верхньої третини плечової кістки. Фельдшер швидкої допомоги надає невідкладну допомогу. Який рівень транспортної іммобілізації при транспортуванні?

- A** \* Від пальців пошкодженої кисті до лопатки здорової руки
- B** Від променево-зап'ясткового суглоба до плечового суглоба

**C** Від ліктьового суглоба до лопатки здорової руки

**D** Від пальців кисті до лопатки хворої руки

**E** Від пальців пошкодженої кисті до верхньої третини плеча

35

У хворого діагностовано перелом кісток тазу. Назвіть метод транспортування пацієнта?

**A** \*У положенні “жаби”

**B** На щиті

**C** Сидячи в кріслі

**D** Лежачи на правому боці

**E** Лежачи на животі

36

Який метод транспортування хворого з підозрою на перелом хребта?

**A** \*Лежачи на щиті

**B** Лежачи на правому боці

**C** В положенні “жаби”

**D** Лежачи на лівому боці

**E** Сидячи на кріслі

37

Які гігієнічні засоби порекомендує фельдшер для гігієни порожнини рота у дитини зі здоровими яснами і зубами?

**A** \*Дитячі гігієнічні зубні пасти

**B** Зубний порошок

**C** Лікувально-профілактичні зубні пасти

**D** Лікувально-профілактичні зубні еліксири

**E** Зубочистки

38

Назвіть ендемічне захворювання, яке характеризується порушенням мінералізації твердих тканин зубів і виникає внаслідок інтоксикації організму іонами фтору (концентрація фтору в питній воді 1,5 мг/л)

**A** \*Флюороз зубів

**B** Системна гіпоплазія

**C** Мармурова хвороба

**D** Стирання зубів

**E** Гіперплазія емалі.

39

Фельдшер “Швидкої допомоги” прибув на виклик. У потерпілого рвана рана передньої черевної стінки, через яку назовні випали петлі тонкого кишечника та прядка великого сальника. Які дії категорично заборонені при наданні невідкладної допомоги?

**A** \*Заправляти органи, що випали назовні, в черевну порожнину

**B** Накладати асептичну пов’язку

**C** Проводити протишокову терапію

**D** Вводити кровозупинні препарати

**E** Прикладати холод до рани

40

У хворого є відкритий перелом кісток гомілки внаслідок удару переднім бампером легкового автомобілю. Який перелом при цьому найбільш вірогідний?

**A** \*Багатоуламковий

**B** Вколочений

**C** Компресійний

**D** Відривний

## **E** Гвинтоподібний

**41**

Під час проведення непрямого масажу серця грудина повинна продавлюватись приблизно на:

**A** \*4-6 см

**B** 0,5-1 см

**C** 1-2 см

**D** 2-3 см

**E** 6-9 см

**42**

На вулиці під час проведення непрямого масажу серця ви відчули характерний хруст, що свідчить про перелом ребра. Ваші дії:

**A** \* Продовжувати СЛР, правильно розташувавши руки на грудині

**B** Припинити реанімаційні міроприємства та застосувати прекардіальний удар

**C** Константувати біологічну смерть потерпілого

**D** Перейти до прямого масажу серця

**E** Продовжувати СЛР, змістивши руки до неушкоджених ребер

**43**

У потерпілого Л. 29 років була констатована клінічна смерть. М/с проводить серцево-легеневу реанімацію. Що в першу чергу свідчить про ефективність закритого масажусерця?

**A** \* Пульсація на сонній артерії

**B** Пасивні рухи грудної клітки

**C** Зниження температури тіла

**D** Відсутність свідомості

**E** Розширені зіниці

**44**

На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання.

Пульс і АТ не визначаються, зіниці на світло не реагують. Який термінальний стан у потерпілої?

**A** \* Клінічна смерть

**B** Передагональний стан

**C** Агонія

**D** Колапс

**E** Травматичний шок

**45**

У пацієнта Р, 43 р. Через 20 хвилин після введення 32 ОД інсуліну виникла загальна слабість, пітливість, тремтіння кінцівок, серцебиття. Це характерно для:

**A** \* Стану гіпоглікемії

**B** Печінкової коми

**C** Гіперглікемічної коми

**D** Гіперосмолярної коми

**E** Гіперлактацедемічної коми

**46**

При огляді хворого фельдшер констатував відсутність свідомості, рухів грудної клітки, відсутність пульсу на сонній артерії, розширені зіниці без реакції на світло. Який найбільш вірогідний діагноз?

**A** \* Клінічна смерть

**B** Алкогольний делірій

**C** Предагональний період

**D** Коматозний стан  
**E** Агонія

47

Ви проводите обстеження пацієнта, який був збитий вантажівкою. Він знаходиться без свідомості, з носа та вух витікає ліквор і кров. Про що свідчить вище перераховані симптоми?

- A** \*Перелом основи черепа
- B** Перелом склепіння черепа
- C** Перелом кісток носа
- D** Перелом щелеп
- E** Носова кровотеча

Файл: Дисципліни хірург.профілю.doc  
Каталог: C:\WINDOWS\system32  
Шаблон: C:\Documents and Settings\User\Application  
Data\Microsoft\Шаблоны\Normal.dotm  
Заголовок:  
Содержание:  
Автор: Admin  
Ключевые слова:  
Заметки:  
Дата создания: 30.04.2014 9:53:00  
Число сохранений: 2  
Дата сохранения: 30.04.2014 9:53:00  
Сохранил: Admin  
Полное время правки: 0 мин.  
Дата печати: 12.05.2014 8:28:00  
При последней печати  
страниц: 9  
слов: 2 520 (прибл.)  
знаков: 14 364 (прибл.)