

**Крок M Сестринська справа**  
**Медсестринство в акушерстві**

1

При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина плода. Спинка плода зліва. Якому визначенням за акушерською термінологією відповідають отримані дані акушерського дослідження?

- A** \* I позиція, головне передлежання
- B** II позиція, головне передлежання
- C** I позиція, сідничне передлежання
- D** II позиція, сідничне передлежання
- E** Поперечне положення

2

Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяполового періоду?

- A** \* 2 години
- B** 3 години
- C** 6 годин
- D** 24 години
- E** 48 годин

3

Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився I період пологів. Які ознаки вказують на його завершення?

- A** \* Повне відкриття шийки матки
- B** Народження посліду
- C** Відкриття шийки матки на 3 см
- D** Постійний ниючий біль
- E** Народження плода

4

Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра повинна зробити патронаж?

- A** \* Протягом 3 днів після виписки породіллі із пологового будинку
- B** Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку
- C** Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку
- D** Протягом 3 місяців після виписки породіллі із пологового будинку
- E** Протягом 14 днів після виписки породіллі із пологового будинку

5

Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона повинна застосувати?

- A** \* Прийоми Леопольда-Левицького
- B** Призначення сечі на наявність ХГ
- C** Вимірювання обводу живота
- D** Бімануальне обстеження
- E** Огляд шийки матки у дзеркалах

6

Вагітна М., 31 року, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що дорівнює 90 см і ВСДМ-30 см. Яка передбачувана маса плода?

- A** 2700 г
- B** 3100 г
- C** 3000 г
- D** 2900 г
- E** 2500 г

7

Роділля Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальнюю пологовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою 3200 г. Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?

- A** Альфельда
- B** Кюстнера-Чукалова
- C** Шредера
- D** Довженка
- E** Клейна

8

У вагітної А., 25 років, серцебиття плода 130 уд. /хв. , вислуховується ліворуч нижче пупка і більше до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода.

- A** I позиція, передній вид, головне передлежання
- B** II позиція, передній вид, головне передлежання
- C** I позиція, задній вид, тазове передлежання
- D** II позиція, задній вид, головне передлежання
- E** I позиція, передній вид, тазове передлежання

9

Вагітна Л., 29 років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулась до лікаря ж/к зі скаргами на швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів. Вкажіть допустиму прибавку ваги за тиждень.

- A** 350 грамів
- B** 250 грамів
- C** 450 грамів
- D** 550 грамів
- E** 650 грамів

10

Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що спинка плода розташована праворуч. Вкажіть позицію плоду?

- A** Друга
- B** Перша
- C** П'ята
- D** Четверта
- E** Третя

11

У вагітної до початку пологової діяльності відійшли навколоплідні води. Про яке відходження вод йде мова?

- A** \* Передчасне
- B** Раннє
- C** Своєчасне
- D** Запізніле
- E** -

12

Вагітна в терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4 – 6 разів на добу, нудоту, відразу до їжі. Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки?

- A** \* Блювання вагітної
- B** Відраза до продуктів харчування
- C** Порушення засвоєння їжі

- D** Порушення режиму сна  
**E** Отруєння

13

Пациєнка 20 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на затримку менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем установлена вагітність 7 - 8 тижнів. Назвати документ, який оформляється при взятті на облік по вагітності?

- A** \*Індивідуальна карта вагітної і породіллі  
**B** Обмінна карта  
**C** Амбулаторна карта  
**D** Історія пологів  
**E** Контрольна карта диспансерного спостереження

14

На 3-й день после родов у родильницы поднялась температура – 38°C, боль в молочной железе. Медсестра осмотрела родильницу: в левой молочной железе пальпируется уплотнение 7x6, болезненное, над ним гиперемия, отек. Каковы действия медсестры по реализации плана медсестринского вмешательства?

- A** \*Пузырь со льдом на область молочной железы, вызвать врача  
**B** Ввести анальгетики  
**C** Грелка на область молочной железы  
**D** Ввести жаропонижающие средства  
**E** Компресс на молочную железу

15

Роженица Н., в III периоде родов, признаки Альфельда, Шредера положительные. Что должна сделать медсестра для реализации плана медсестринских вмешательств?

- A** \*Предложить роженице потужиться  
**B** Потянуть за пуповину  
**C** Провести наружный массаж матки  
**D** Измерить АД  
**E** Применить метод Абуладзе

16

У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності 38-39 тижнів з кровотечею зі статевих органів. При піхвовому дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішнє вічко повністю закрите губчастою тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?

- A** \*Центральне передлежання плаценти  
**B** Бокове передлежання плаценти  
**C** Крайове передлежання плаценти  
**D** Низьке прикрілення плаценти  
**E** Шийна вагітність

17

Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржиться на підвищення температури до 39°C, озноб, біль внизу живота, гнійно-кров'янисті виділення зі статевих органів. Яке ускладнення виникло у породіллі?

- A** \*Післяпологовий ендометрит  
**B** Лохіометра  
**C** Аднексит  
**D** Перитоніт  
**E** Післяпологова виразка

18

Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють 25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?

- A \*Нормальний таз
- B Простий плоский таз
- C Плоскорахітичний таз
- D Загальнозвужений таз
- E Поперечнозвужений таз

19

У пологовий будинок поступила роділля. Пологи II, термінові. Розміри тазу 23-26-28-17 см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна. Перейми часті, болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення виникло у роділлі?

- A \*Загроза розриву матки
- B Розрив матки, що розпочався
- C Розрив матки, що відбувається
- D Тетанус матки
- E Звуження тазу III ступеню

20

У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають таке відходження навколоплідних вод?

- A \*Раннє
- B Вчасне
- C Передчасне
- D Запізніле
- E Високий надрив плодового міхура

21

Роділля К., 26 р. Пологи II. III період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість послідового періоду?

- A 30 хвилин
- B 15 хвилин
- C 60 хвилин
- D 45 хвилин
- E 40 хвилин

22

Медична сестра проводить вимірювання зовнішніх розмірів тазу. Що характерно для загальнорівномірнозвуженого тазу?

- A Всі розміри зменшені на однакову величину
- B Вкорочені прямі розміри тазу
- C Вкорочені поперечні розміри тазу
- D Вкорочені усі косі розміри тазу
- E Зменшення прямого розміру входу в малий таз

23

Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, "балотуюча", крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода.

- A \*Повздовжне положення, перша позиція, головне передлежання.
- B Повздовжне положення, друга позиція, головне передлежання.
- C Повздовжне положення, перша позиція, тазове передлежання.
- D Поперечне положення, друга позиція.
- E Повздовжне положення, друга позиція, тазове передлежання.

**24**

Під час вимірювання тазу при взятті вагітної на облік медсестрою встановлені наступні розміри: 24-26-28-18 см. Назвіть форму тазу вагітної.

- A** \*Загальнорівномірнозвужений таз.
- B** Поперечнозвужений таз.
- C** Косозміщений таз.
- D** Плоский таз.
- E** Звужений таз.

**25**

Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу – перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:

- A** \*24 тижні
- B** 20 тижнів
- C** 16 тижнів
- D** 28 тижнів
- E** 32 тижні

**26**

Роділля М., 26 років, I період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри пульсу і артеріального тиску у роділлі?

- A** \*Кожні 2 години
- B** Кожні 4 години
- C** Кожні 6 години
- D** Кожну годину
- E** Кожні 30 хвилин

**27**

У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви оберете:

- A** \*Щотижневе зважування вагітної
- B** Підрахунок частоти дихання
- C** Підрахунок частоти серцевих скорочень
- D** Вимірювання температури тіла
- E** Визначення внутрішньоутробної маси плода

**28**

На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка Г. 35 років, з приводу загрози переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду, медична сестра повинна звернути увагу на:

- A** \*Наявність кров'янистих виділень із піхви
- B** Показники температури тіла
- C** Показники артеріального тиску
- D** Частоту серцевих скорочень
- E** Наявність апетиту

**29**

Породіллі проведений курс лікування з приводу післяполового маститу. При оцінці результатів медсестринських втручань Ви в першу чергу звернули увагу на :

- A** \*Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз
- B** Нормалізацію лактації
- C** Нормалізацію сну
- D** Покращення апетиту
- E** Покращення самопочуття

30

При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слаболужна. Це характерно для:

- A \*III ступеню чистоти піхвового вмісту
- B I ступеню чистоти піхвового вмісту
- C II ступеню чистоти піхвового вмісту
- D IV ступеню чистоти піхвового вмісту
- E V ступеню чистоти піхвового вмісту

31

При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає :

- A \*24 тижням вагітності
- B 36 тижням вагітності
- C 28 тижням вагітності
- D 32 тижням вагітності
- E 40 тижням вагітності

32

Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної виявлено: положення плода повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання, Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода.

- A \* Нижче пупка ліворуч
- B Вище пупка праворуч
- C Нижче пупка праворуч
- D Вище пупка ліворуч
- E На рівні пупка

33

У пацієнтки 28 років під час профілактичного огляду було виявлено гіперемію в ділянці зовнішнього вічка шийки матки. Подальша тактика медичної сестри:

- A \*направити до лікаря гінеколога
- B призначити спринцовання
- C призначити піхвові ванночки
- D призначити заспокійливі
- E зробити посів піхвових видіlenь

34

Роділля поступає в пологовий будинок. Для визначення очікуваної маси плода медсестра вимірює обвід живота. На якому рівні слід розмістити сантиметрову стрічку?

- A \*На рівні пупка
- B Посередині між пупком і мечоподібним відростком
- C На три поперечні пальці нижче пупка
- D На два поперечні пальці вище пупка
- E На рівні висоти стояння дна матки

35

Роділля ,34 років, доставлена машиною швидкої допомоги в пологовий будинок. Пологи в строк. За яким показником медична сестра оцінить початок половогої діяльності?

- A \*За частотою та тривалістю перейм
- B За станом роділлі
- C За станом плода
- D За часом вилиття навколоплодових вод
- E За станом плодового міхура

**36**

Другий період пологів. Голівка плода прорізується. Яке залежне сестринське втручання потрібно виконати з метою профілактики кровотечі в III періоді пологів?

- A** \*Ввести метилергометрин
- B** Ввести вікасол
- C** Ввести дицинон
- D** Ввести маммофізин
- E** Ввести анальгін

**37**

У породіллі на третю добу післяполового періоду з'явилися скарги на болі в молочних залозах. Молочні залози значно та рівномірно збільшені, нагрубші, болючі при пальпації, при натисканні з сосків виділяються крапельки молока. Яке медсестринське втручання потрібно виконати в першу чергу?

- A** \*Спорожнити молочні залози шляхом зціджування
- B** Обмежити пиття
- C** Імобілізувати молочні залози
- D** Компрес на молочні залози
- E** Ввести знеболюючий препарат

**38**

Медсестра готує вагітну до УЗД. Що доцільно провести для реалізації плану медсестринського втручання?

- A** \*Провести роз'яснення в плані підготовки
- B** Виміряти АТ, Ps
- C** Обмеження гострої їжі
- D** Обмеження вживання рідини
- E** Провести бесіду з родичами

**39**

У післяполовому віddіленні медсестра проводить бесіду з породіллею. На які проблеми породіллі треба звернути увагу?

- A** \*Скарги породіллі з боку статевих органів та молочних залоз
- B** Скарги породіллі на підвищену пітливість
- C** Скарги породіллі на підсилення апетиту
- D** Скарги породіллі на сонливість
- E** Скарги породіллі на відчуття спраги

**40**

У вагітності 35 років, в терміні вагітності 20 тижнів було зафіковано патологічну прибавку у вазі. Яке обстеження необхідно провести для виявлення прихованих набряків при підозрі прогестозу?

- A** \*Проба Мак-Клюра-Олдріча
- B** Вимірювання артеріального тиску на обох руках
- C** Визначення білку в сечі
- D** Визначення сечовини та креатиніну
- E** УЗД

**41**

Ви проводите заняття в жіночій консультації з питань статевого здоров'я. Обговорюючи фази нормального менструального циклу, ви повідомите про зміни, що відбуваються в яєчниках під час овуляції, а саме:

- A** \*Розрив фолікула і вихід яйцеклітини
- B** Утворення жовтого тіла менструації

- C** Продукування прогестерону
- D** Утворення жовтого тіла вагітності
- E** Створення умов для імплантації

42

Під час обстеження вагітної в терміні 36 тижнів Ви з'ясували, що поздовжня вісь плоду утворює з поздовжньою віссю матки прямий кут. Про яке положення плода іде мова?

- A** \*Поперечне
- B** Коце
- C** Поздовжнє
- D** Лобне
- E** Тазове

43

Ви проводите зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком. Визначте термін вагітності.

- A** \*16 тижнів
- B** 12 тижнів
- C** 20тижнів
- D** 30 тижнів
- E** 36 тижнів

44

Ви медична сестра ЖК, приймаєте участь в організації занять з безпечною материнства та батьківства, та інформуєте слухачів про періоди пологів. Які періоди пологів ви знаєте?

- A** \*Розкриття, зганяння, послідовий
- B** Прелімінарний, розкриття, послідовий
- C** Прелімінарний, зганяння, послідовий
- D** Провісники, розкриття, зганяння
- E** Розкриття, зганяння, післяпологовий

45

При обстеженні жінки з терміном 24 тижні була запідозрена багатоплідна вагітність. Який метод обстеження підтверджить багатопліддя?

- A** \* вислуховування серцебиття плода в двох пунктах
- B** вимірювання ОЖ і ВДМ
- C** вимірювання пульсу і АТ жінки
- D** вислуховування серцебиття в одному пункті
- E** вимірювання розмірів тазу

46

Породілля 25 років перебуває у індивідуальній пологовій палаті. Друга доба післяполового періоду. Які показники будуть засвідчувати про фізіологічний перебіг цього періоду?

- A** \* АТ – 120/75 мм.рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,7°C, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисті
- B** АТ - 100/60 мм рт.ст., пульс – 80 уд./хв., t – 37,8°C, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисто-слизові
- C** АТ – 110/60 мм.рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки вище пупка, розм'якшена, лохії кров'янисті
- D** АТ – 125/85 мм.рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки нижче пупка, лохії слизові
- E** АТ – 120/75 мм.рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки за лоном, лохії кров'янисті

47

Медсестра обстежує вагітну жінку в терміні вагітності 36 тижнів. При огляді медсестра звернула увагу, що живіт овоїдної форми, витягнутий в поперечному напрямку. Серцебиття плода – 140 уд./хв., тони ясні, діяльність ритмічна і вислуховується на рівні пупка справа. За допомогою яких прийомів Леопольда-Левицького медсестра може визначити положення та позицію плода?

- A** \*I-го і II-го прийомів Леопольда-Левицького
- B** III-го прийому Леопольда-Левицького
- C** I-го прийому Леопольда-Левицького
- D** III-го і IV-го прийомів Леопольда-Левицького
- E** IV-го прийому Леопольда-Левицького

48

В ранньому післяпологовому періоді за призначенням лікаря медсестра внутрішньом'язово ввела породіллі 1мл (5 ОД) окситоцину. Що буде критерієм оцінки результатів медсестринського втручання?

- A** \*підвищення тонусу матки
- B** підвищення артеріального тиску
- C** зниження тонусу матки
- D** прискорення пульсу
- E** зниження артеріального тиску

49

Роділля 26 років доставлена у пологове відділення з переймами, які почалися 12 годин тому. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через 12-15 хв. Серцебиття плода 140 уд./хв., ритмічне. При піхвовому обстеженні: шийка згладжена, розкриття 4 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Про яке ускладнення пологів йде мова?

- A** \*первинна слабкість пологової діяльності
- B** дискоординована пологова діяльність
- C** надмірно сильна пологова діяльність
- D** вторинна слабкість пологової діяльності
- E** загроза розриву матки

50

Ви працюєте у приймальному відділенні пологового будинку. Поступає жінка з доношеною вагітністю. Що свідчить про початок пологів?

- A** \*Наявність регулярних перейм
- B** Наявність нерегулярних перейм
- C** Відходження навколоподібних вод
- D** Відходження слизової пробки
- E** Опущення дна матки

51

Ви працюєте медичною сестрою в жіночій консультації. Які ознаки відносяться до ймовірних ознак вагітності?

- A** зміна величини, форми і консистенції матки
- B** зміна апетиту, смаку, нудота, блювання зранку
- C** пігментація шкіри на обличчі, навколо сосків, по білій лінії живота
- D** промацування частин плода
- E** вислуховування серцебиття плода

52

У породіллі 20 років щойно народилась доношена дитина чоловічої статі. Необхідно провести профілактику офтальмії. Назвіть препарат за допомогою якого здійснюють таку профілактику?

- A** 1% тетрациклінова мазь

**B** Пеніцилін.

**C** Преднізолон.

**D** Фурацилін.

**E** 2% олійний розчин хлорофіліпту

53

У роділлі III період пологів. Через 10 хвилин дно матки відхилилося у бік правого підребір'я. Вкажіть ознаку відділення плаценти.

**A** \*Шредера

**B** Альфельда

**C** Довженка

**D** Чукалова-Кюстнера

**E** Абуладзе

54

У першовагітної жінки 24 років терміном 38 – 39 тижнів, з'явився переймоподібний біль внизу живота і попереку по 15-20 секунд через 1-2 години. Як оцінити такі симптоми?

**A** \*Прелімінарний період

**B** Перший період пологів

**C** Третій період пологів

**D** Післяпологовий період

**E** Другий період пологів

55

У роділлі К, 25 р. при піхвовому обстеженні шийка матки згладжена, розкриття 4 см; плодовий міхур відсутній, передлегла частина сідниці. Вкажіть період пологів.

**A** \*I період пологів

**B** II період пологів

**C** Провісники пологів

**D** III період пологів

**E** Післяпологовий період

56

На прийом у жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на поганий апетит, нудоту, припинення менструації протягом 2 місяців. Який метод дослідження необхідно провести для виявлення вагітності?

**A** \*Огляд в дзеркалах на гінекологічному кріслі

**B** Вимірювання розмірів тазу

**C** Вимірювання висоти стояння дна матки

**D** Вимірювання окружності живота

**E** Вимірювання індексу Соловйова

57

Медична сестра при огляді вагітної жінки визначає розташування плода у порожнині матки. Для цього вона застосовує

**A** \*Прийоми Леопольда

**B** Вимірювання розмірів тазу

**C** Аускультацію плода

**D** Перкусію живота

**E** Вагінальне дослідження

58

Вагітна цікавиться у медичної сестри про термін пологів, якщо перший день останньої менструації був 10.05. Медична сестра визначила очікувану дату пологів:

**A** 17.02

**B** 10.03

**C** 29.03

**D** 20.04

**E** 27.05

59

Породілля, 23 роки, знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки перебуває на рівні пупка, лохії кров'янисті. Якій добі післяпологового періоду відповідають ці симптоми?

**A** 1-2-й добі

**B** 3-4-й добі

**C** 5-6-й добі

**D** 7-8-й добі

**E** 10-й добі

60

У пологовий будинок доставлено першороділлю 23 років у тяжкому непритомному стані. Зі слів чоловіка, у дружини з'явилися: головний біль , біль у надчревній ділянці, було блювання, потім почався судомний напад з втратою свідомості. При госпіталізації: свідомість відсутня, обличчя одутле, бліде, повіки набряклі, АТ – 160/100 мм рт. ст. Яка дійсна проблема пацієнтки?

**A** \*Судомний напад

**B** Біль голови

**C** Блювання

**D** Одутле обличчя

**E** Гіпертензія

61

Після народження дитини необхідно провести профілактику офтальмії. Який препарат повинна підготувати медсестра ?

**A** \*Мазь тетрациклінову

**B** Розчин фурациліну

**C** Розчин йодонату

**D** Розчин сульфацилу натрію

**E** Мазь ністатинову

62

У жіночою консультацію на облік поставлена пацієнка зі строком вагітності 6-7 тижнів . Скарги на нудоту . Про що в першу чергу необхідно провести бесіду з пацієнтою ?

**A** \*Про раціональне харчування

**B** Про гігієну зовнішніх статевих органів

**C** Про догляд за молочними залозами

**D** Про необхідність відвідування жіночої консультації

**E** Про необхідність обстеження

63

Визначити, яке положення плоду, якщо голівка біля дна матки:

**A** \*Повздовжнє

**B** Сіднічне

**C** Потиличне

**D** Тазове

**E** Поперечне

64

Третім прийомом Леопольда можна визначити:

- A** Передлежання плоду
- B** Вид позиції плоду
- C** Позицію плоду
- D** Багатоплідну вагітність
- E** Очікувану масу плоду

65

На скільки см вважається розкриття шийки матки повним:

- A** \*10-12 см.
- B** 8-9 см.
- C** 9-10 см.
- D** 13-14 см
- E** 15 см

66

У вагітної при зовнішньому обстеженні прийомами Леопольда встановлено: праворуч - пальпуюється щільна, гладенька широка поверхня, зліва - мілкі виступи, над входом в таз - щільна балотуюча велика частина плода. Вкажіть положення, позицію та передлежання плода.

- A** \*Повздовжнє, друга, головне
- B** Повздовжнє, друга, сідничне
- C** Повздовжнє, перша, сідничне
- D** Повздовжнє, перша, головне
- E** Косе, друга позиція