

Крок M Сестринська справа

Медсестринство в акушерстві

1

При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина плода. Спинка плода зліва. Якому визначенням за акушерською термінологією відповідають отримані дані акушерського дослідження?

- A** * I позиція, головне передлежання
- B** II позиція, головне передлежання
- C** I позиція, сідничне передлежання
- D** II позиція, сідничне передлежання
- E** Поперечне положення

2

Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяполового періоду?

- A** * 2 години
- B** 3 години
- C** 6 годин
- D** 24 години
- E** 48 годин

3

Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився I період пологів. Які ознаки вказують на його завершення?

- A** * Повне відкриття шийки матки
- B** Народження посліду
- C** Відкриття шийки матки на 3 см
- D** Постійний ниючий біль
- E** Народження плода

4

Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра повинна зробити патронаж?

- A** * Протягом 3 днів після виписки породіллі із пологового будинку
- B** Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку
- C** Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку
- D** Протягом 3 місяців після виписки породіллі із пологового будинку
- E** Протягом 14 днів після виписки породіллі із пологового будинку

5

Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона повинна застосувати?

- A** * Прийоми Леопольда-Левицького
- B** Призначення сечі на наявність ХГ
- C** Вимірювання обводу живота
- D** Бімануальне обстеження
- E** Огляд шийки матки у дзеркалах

6

Вагітна М., 31 року, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що дорівнює 90 см і ВСДМ-30 см. Яка передбачувана маса плода?

- A** 2700 г
- B** 3100 г
- C** 3000 г
- D** 2900 г
- E** 2500 г

7

Роділля Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальнюю пологовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою 3200 г. Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?

- A** Альфельда
- B** Кюстнера-Чукалова
- C** Шредера
- D** Довженка
- E** Клейна

8

У вагітної А., 25 років, серцебиття плода 130 уд. /хв. , вислуховується ліворуч нижче пупка і близьче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода.

- A** I позиція, передній вид, головне передлежання
- B** II позиція, передній вид, головне передлежання
- C** I позиція, задній вид, тазове передлежання
- D** II позиція, задній вид, головне передлежання
- E** I позиція, передній вид, тазове передлежання

9

Вагітна Л., 29 років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулась до лікаря ж/к зі скаргами на швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів. Вкажіть допустиму прибавку ваги за тиждень.

- A** 350 грамів
- B** 250 грамів
- C** 450 грамів
- D** 550 грамів
- E** 650 грамів

10

У післяпологовому віddіленні медична сестра здійснює I етап сестринського процесу.Що із нижчепереліченого належить до суб'єктивного обстеження пацієнтки:

- A** *Бесіда з породіллею
- B** Вимірювання температури
- C** Визначення частоти пульсу
- D** Оцінка характеру лохій
- E** Визначення рівня гемоглобіну в крові

11

Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні завнішніх розмірів тазу отримали дані: 26 – 28 – 31 – 20. Який таз у жінки?

- A** * Нормальний
- B** Чоловічий
- C** Плоскорахітичний
- D** Простий плоский
- E** Загальнорівномірнозвужений

12

Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що спинка плода розташована праворуч. Вкажіть позицію плоду?

- A** Друга
- B** Перша
- C** П'ята

D Четверта
E Третя

13

У вагітної до початку половогої діяльності відійшли навколоплідні води. Про яке відходження вод їде мова?

- A** * Передчасне
B Раннє
C Своєчасне
D Запізніле
E -

14

Вагітна в терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4 – 6 разів на добу, нудоту, відразу до їжі. Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки?

- A** * Блювання вагітної
B Відраза до продуктів харчування
C Порушення засвоєння їжі
D Порушення режиму сна
E Отруєння

15

Пацієнка 20 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на затримку менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем установлена вагітність 7 - 8 тижнів. Назвати документ, який оформляється при взятті на облік по вагітності?

- A** *Індивідуальна карта вагітної і породіллі
B Обмінна карта
C Амбулаторна карта
D Історія пологів
E Контрольна карта диспансерного спостереження

16

На 3-й день после родов у родильницы поднялась температура – 38°C, боль в молочной железе. Медсестра осмотрела родильницу: в левой молочной железе пальпируется уплотнение 7x6, болезненное, над ним гиперемия, отек. Каковы действия медсестры по реализации плана медсестринского вмешательства?

- A** *Пузырь со льдом на область молочной железы, вызвать врача
B Ввести анальгетики
C Грелка на область молочной железы
D Ввести жаропонижающие средства
E Компресс на молочную железу

17

Роженица Н., в III периоде родов, признаки Альфельда, Шредера положительные. Что должна сделать медсестра для реализации плана медсестринских вмешательств?

- A** * Предложить роженице потужиться
B Потянуть за пуповину
C Провести наружный массаж матки
D Измерить АД
E Применить метод Абуладзе

18

У беременной 27 лет, при тазометрии выявилось, что размеры таза составили 26-29-31-20. Индекс Соловьева - 14,5 см. Определите истинную конъюгату.

- A** *11 см
B 12 см

C 9 см

D 10 см

E 13 см

19

У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності 38-39 тижнів з кровотечею зі статевих органів. При піхвовому дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішне вічко повністю закрите губчастою тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?

A *Центральне передлежання плаценти

B Бокове передлежання плаценти

C Крайове передлежання плаценти

D Низьке прикріplення плаценти

E Шийна вагітність

20

Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржиться на підвищення температури до 39°C, озноб, біль внизу живота, гнійно-кров'янисті виділення зі статевих органів. Яке ускладнення виникло у породіллі?

A *Післяпологовий ендометрит

B Лохіометра

C Аднексит

D Перитоніт

E Післяпологова виразка

21

Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють 25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?

A *Нормальний таз

B Простий плоский таз

C Плоскорахітичний таз

D Загальнозвужений таз

E Поперечнозвужений таз

22

До пологового будинку госпіталізовано жінку в строку вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ-40 см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка 136 за 1 хв., та праворуч вище пупка 140 за 1 хв.

Про що йде мова?

A *Багатоплідна вагітність

B Гідроцефалія плода

C Гіантський плід

D Розгинальне передлежання

E Тазове передлежання

23

У пологовий будинок поступила роділля. Пологи II, термінові. Розміри тазу 23-26-28-17 см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна. Перейми часті, болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення виникло у роділлі?

A *Загроза розриву матки

B Розрив матки, що розпочався

C Розрив матки, що відбувається

D Тетанус матки

E Звуження тазу III ступеню

24

У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають таке відходження навколоплідних вод?

- A** *Раннє
- B** Вчасне
- C** Передчасне
- D** Запізніле
- E** Високий надрив плодового міхура

25

Роділля К., 26 р. Пологи II. III період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість послідового періоду?

- A** 30 хвилин
- B** 15 хвилин
- C** 60 хвилин
- D** 45 хвилин
- E** 40 хвилин

26

Медична сестра проводить вимірювання зовнішніх розмірів тазу. Що характерно для загальнорівномірнозвуженого тазу?

- A** Всі розміри зменшені на однакову величину
- B** Вкорочені прямі розміри тазу
- C** Вкорочені поперечні розміри тазу
- D** Вкорочені усі косі розміри тазу
- E** Зменшення прямого розміру входу в малий таз

27

Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, "балотуюча", крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода.

- A** *Повздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання.
- B** Повздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання.
- C** Повздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання.
- D** Поперечне положення, друга позиція.
- E** Повздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання.

28

Під час вимірювання тазу при взятті вагітної на облік медсестрою встановлені наступні розміри: 24-26-28-18см. Назвіть форму тазу вагітної.

- A** *Загальнорівномірнозвужений таз.
- B** Поперечнозвужений таз.
- C** Косозміщений таз.
- D** Плоский таз.
- E** Звужений таз.

29

У породіллі в післяпологовому періоді медична сестра виявила кровотечу зі статевих шляхів. Крововтрата під час пологів склала 450мл. Розривів м'яких тканин родового каналу немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється. Кров, що витікає з матки, утворює згортки. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?

- A** *Гіпотонічна маткова кровотеча.
- B** ДВЗ-синдром.
- C** Атонічна кровотеча.

D Розрив матки.

E Емболія навколо плідними водами.

30

Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу – перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:

A *24 тижні

B 20 тижнів

C 16 тижнів

D 28 тижнів

E 32 тижні

31

Роділля М., 26 років, I період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри пульсу і артеріального тиску у роділлі?

A *Кожні 2 години

B Кожні 4 години

C Кожні 6 години

D Кожну годину

E Кожні 30 хвилин

32

У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви оберете:

A *Щотижневе зважування вагітної

B Підрахунок частоти дихання

C Підрахунок частоти серцевих скорочень

D Вимірювання температури тіла

E Визначення внутрішньоутробної маси плода

33

На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнка Г. 35 років, з приводу загрози переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду, медична сестра повинна звернути увагу на:

A *Наявність кров'янистих виділень із піхви

B Показники температури тіла

C Показники артеріального тиску

D Частоту серцевих скорочень

E Наявність апетиту

34

Породіллі проведений курс лікування з приводу післяполового маститу. При оцінці результатів медсестринських втручань Ви в першу чергу звернули увагу на :

A *Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз

B Нормалізацію лактації

C Нормалізацію сну

D Покращення апетиту

E Покращення самопочуття

35

При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слаболужна. Це характерно для:

A *III ступеню чистоти піхвового вмісту

B I ступеню чистоти піхвового вмісту

C II ступеню чистоти піхвового вмісту

- D** IV ступеню чистоти піхвового вмісту
E V ступеню чистоти піхвового вмісту

36

При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає :

- A** *24 тижням вагітності
B 36 тижням вагітності
C 28 тижням вагітності
D 32 тижням вагітності
E 40 тижням вагітності

37

Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної виявлено: положення плода повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання, Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода.

- A** * Нижче пупка ліворуч
B Вище пупка праворуч
C Нижче пупка праворуч
D Вище пупка ліворуч
E На рівні пупка

38

У пацієнтки 28 років під час профілактичного огляду було виявлено гіперемію в ділянці зовнішнього вічка шийки матки. Подальша тактика медичної сестри:

- A** *направити до лікаря гінеколога
B призначити спринцовування
C призначити піхвові ванночки
D призначити заспокійливі
E зробити посів піхвових виділень

39

Роділля поступає в пологовий будинок. Для визначення очікуваної маси плода медсестра вимірює обвід живота. На якому рівні слід розмістити сантиметрову стрічку?

- A** *На рівні пупка
B Посередині між пупком і мечоподібним відростком
C На три поперечні пальці нижче пупка
D На два поперечні пальці вище пупка
E На рівні висоти стояння дна матки

40

Роділля ,34 років, доставлена машиною швидкої допомоги в пологовий будинок. Пологи в строк. За яким показником медична сестра оцінить початок пологової діяльності?

- A** *За частотою та тривалістю перейм
B За станом роділлі
C За станом плода
D За часом вилиття навколоплодових вод
E За станом плодового міхура

41

Другий період пологів. Голівка плода прорізується. Яке залежне сестринське втручання потрібно виконати з метою профілактики кровотечі в III періоді пологів?

- A** *Ввести метилергометрин
B Ввести вікасол
C Ввести дицилон
D Ввести маммофізин

E Вести анальгін

42

У породіллі на третю добу післяпологового періоду з'явились скарги на болі в молочних залозах. Молочні залози значно та рівномірно збільшені, нагрубші, болючі при пальпації, при натисканні з сосків виділяються крапельки молока. Яке медсестринське втручання потрібно виконати в першу чергу?

A *Спорожнити молочні залози шляхом зціджування

B Обмежити пиття

C Імобілізувати молочні залози

D Компрес на молочні залози

E Вести знеболюючий препарат

43

Медсестра готує вагітну до УЗД. Що доцільно провести для реалізації плану медсестринського втручання?

A *Провести роз'яснення в плані підготовки

B Виміряти АТ, Ps

C Обмеження гострої їжі

D Обмеження вживання рідини

E Провести бесіду з родичами

44

У післяпологовому віddіленні медсестра проводить бесіду з породіллею. На які проблеми породіллі треба звернути увагу?

A *Скарги породіллі з боку статевих органів та молочних залоз

B Скарги породіллі на підвищену пітливість

C Скарги породіллі на підсилення апетиту

D Скарги породіллі на сонливість

E Скарги породіллі на відчуття спраги

45

Першороділля 23-х років народила живого доношеного хлопчика вагою 3200 г. Через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?

A *Запропонувати роділлі потужитись

B Вести в/в 1 мл окситоцину

C Застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревічу

D Застосувати зовнішній прийом по Гентеру

E Провести ручне виділення посліду

46

У вагітної 35 років, в терміні вагітності 20 тижнів було зафіковано патологічну прибавку у вазі. Яке обстеження необхідно провести для виявлення прихованіх набряків при підозрі прогестозу?

A *Проба Мак-Клюра-Олдріча

B Вимірювання артеріального тиску на обох руках

C Визначення білку в сечі

D Визначення сечовини та креатиніну

E УЗД

47

Ви проводите заняття в жіночій консультації з питань статевого здоров'я. Обговорюючи фази нормального менструального циклу, ви повідомите про зміни, що відбуваються в яєчниках під час овуляції, а саме:

A *Розрив фолікула і вихід яйцеклітини

B Утворення жовтого тіла менструації

C Продуковання прогестерону

D Утворення жовтого тіла вагітності

E Створення умов для імплантації

48

Під час обстеження вагітної в терміні 36 тижнів Ви з'ясували, що поздовжня вісь плоду утворює з поздовжньою віссю матки прямий кут. Про яке положення плода іде мова?

A *Поперечне

B Кося

C Поздовжнє

D Лобне

E Тазове

49

Ви проводите зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком. Визначте термін вагітності.

A *16 тижнів

B 12 тижнів

C 20тижнів

D 30 тижнів

E 36 тижнів

50

Ви медична сестра ЖК, приймаєте участь в організації занять з безпечною материнства та батьківства, та інформуєте слухачів про періоди пологів. Які періоди пологів ви знаєте?

A *Розкриття, зганяння, послідовний

B Прелімінарний, розкриття, послідовний

C Прелімінарний, зганяння, послідовний

D Провісники, розкриття, зганяння

E Розкриття, зганяння, післяпологовий

51

При обстеженні жінки з терміном 24 тижні була запідозрена багатоплідна вагітність. Який метод обстеження підтверджить багатопліддя?

A * вислуховування серцебиття плода в двох пунктах

B вимірювання ОЖ і ВДМ

C вимірювання пульсу і АТ жінки

D вислуховування серцебиття в одному пункті

E вимірювання розмірів тазу

52

Породілля 25 років перебуває у індивідуальній пологовій палаті. Друга доба післяполового періоду. Які показники будуть засвідчувати про фізіологічний перебіг цього періоду?

A * АТ – 120/75 мм рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,7°C, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисті

B АТ - 100/60 мм рт.ст., пульс – 80 уд./хв., t – 37,8°C, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисто-слизові

C АТ – 110/60 мм рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки вище пупка, розм'якшена, лохії кров'янисті

D АТ – 125/85 мм рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки нижче пупка, лохії слизові

E АТ – 120/75 мм рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки за лоном, лохії кров'янисті

53

Медсестра обстежує вагітну жінку в терміні вагітності 36 тижнів. При огляді медсестра звернула увагу, що живіт овоїдної форми, витягнутий в поперечному напрямку. Серцебиття плода – 140 уд./хв., тони ясні, діяльність ритмічна і вислуховується на рівні пупка справа. За допомогою яких прийомів Леопольда-Левицького медсестра може визначити положення та позицію плода?

- A *I-го і II-го прийомів Леопольда-Левицького
- B III-го прийому Леопольда-Левицького
- C I-го прийому Леопольда-Левицького
- D III-го і IV-го прийомів Леопольда-Левицького
- E IV-го прийому Леопольда-Левицького

54

В реєстратору жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на облік з приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв'язок жіночої консультації, пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра?

- A * індивідуальну карту вагітної і роділлі
- B контрольну карту диспансерного обліку
- C журнал обліку вагітності
- D медичну картку амбулаторного хворого
- E історію пологів

55

В ранньому післяпологовому періоді за призначенням лікаря медсестра внутрішньом'язово ввела породіллі 1мл (5 ОД) окситоцину. Що буде критерієм оцінки результатів медсестринського втручання?

- A *підвищення тонусу матки
- B підвищення артеріального тиску
- C зниження тонусу матки
- D прискорення пульсу
- E зниження артеріального тиску

56

Ви медсестра жіночої консультації, у обов'язки якої входить патронаж породіль. Скільки часу триває післяпологовий період ?

- A 6-8 тижнів
- B 4-5 тижнів
- C 2-3 тижні
- D 1 місяць
- E 1 рік

57

Роділля 26 років доставлена у пологове відділення з переймами, які почалися 12 годин тому. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через 12-15 хв. Серцебиття плода 140 уд./хв., ритмічне. При піхвовому обстеженні: шийка згладжена, розкриття 4 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Про яке ускладнення пологів йде мова?

- A *первинна слабкість пологової діяльності
- B дискоординована пологова діяльність
- C надмірно сильна пологова діяльність
- D вторинна слабкість пологової діяльності
- E загроза розриву матки

58

Ви працюєте у приймальному відділенні пологового будинку. Поступає жінка з

доношеною вагітністю. Що свідчить про початок пологів?

- A *Наявність регулярних перейм
- B Наявність нерегулярних перейм
- C Відходження навколоподібних вод
- D Відходження слизової пробки
- E Опущення дна матки

59

Ви працюєте медичною сестрою в жіночій консультації. Які ознаки відносяться до імовірних ознак вагітності?

- A зміна величини, форми і консистенції матки
- B зміна апетиту, смаку, нудота, блювання зранку
- C пігментація шкіри на обличчі, навколо сосків, по білій лінії живота
- D промацування частин плода
- E вислуховування серцевиття плода

60

У породіллі 20 років щойно народилась доношена дитина чоловічої статі. Необхідно провести профілактику офтальмії. Назвіть препарат за допомогою якого здійснюють таку профілактику?

- A 1% тетрациклінова мазь
- B Пеніцилін.
- C Преднізолон.
- D Фурацилін.
- E 2% олійний розчин хлорофіліту

61

У роділлі III період пологів. Через 10 хвилин дно матки відхилилося у бік правого підребір'я. Вкажіть ознаку відділення плаценти.

- A *Шредера
- B Альфельда
- C Довженка
- D Чукарова-Кюстнера
- E Абуладзе

62

У вагітної при зовнішньому обстеженні прийомами Леопольда встановлено: праворуч - пальпується щільна, гладенька широка поверхня, зліва - мілкі виступи, над входом в таз - щільна балотуюча велика частина плода. Вкажіть положення, позицію та передлежання плода.

- A *Повздовжнє, друга, головне
- B Повздовжнє, друга, сідничне
- C Повздовжнє, перша, сідничне
- D Повздовжнє, перша, головне
- E Косе, друга позиція

63

У жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на нагрубання молочних залоз, блювоту вранці, затримку місячних на 2 місяці. Який метод обстеження застосувати для підтвердження вагітності

- A Дворучне піхвове дослідження
- B Чотири прийоми Леопольда
- C Визначення ВСДМ
- D Аналіз крові
- E Зважування жінки