

Крок М Сестринська справа
Медсестринство в інших дисциплінах хірургічного профілю

1

До очного центру звернувся пацієнт з травмою лівого ока. Лікар встановив діагноз - Проникаюче поранення лівого ока. Яку пов'язку накладе медична сестра?

- A** * Асептичну біокулярну
- B** Асептичну монокулярну
- C** Колову
- D** Монокулярну лейкопластирну
- E** Косинкову

2

До травм пункту звернувся пацієнт, у якого різана рана гомілки. Після проведення ПХО рани лікар призначив щеплення проти правцю. Яку потенційну проблему попередив лікар?

- A** *Захворювання на правець
- B** Виникнення сепсису
- C** Захворювання на сказ
- D** Виникнення тромбозу
- E** Захворювання на бешиху

3

Пацієнтка звернулася до мамолога зі скаргами на наявність новоутворення в молочній залозі. Який метод з перелічених встановлює діагноз злоякісної пухлини?

- A** *Цитологічне дослідження
- B** Ендоскопічне обстеження
- C** Ехографія
- D** Комп'ютерна томографія
- E** Лабораторні дослідження

4

У пацієнта 50 років лімфогранулематоз. Проходить курс хіміотерапії. Скаржиться медичній сестрі на безсоння, головний біль, нудоту, блювання. Яка її тактика в даній ситуації?

- A** *Повідомити лікаря
- B** Дати протиблювотне
- C** Запропонувати снодійне
- D** Порекомендувати дотримуватися дієти
- E** Застосувати знеболювальне

5

Пацієнт 63 років викликав швидку допомогу у зв'язку зі скаргами на сильний різкий біль у поперековій ділянці справа з іррадіацією в зовнішні статеві органи, часте болісне сечовиділення. З анамнезу: хворіє на нирковокам'яну хворобу. Яке незалежно сестринське втручання виконає медсестра?

- A** * Тепла грілка на поперекову ділянку
- B** Зігрівальний компрес
- C** Банки
- D** Міхур з льодом
- E** Гірчичники

6

У пацієнта рак легень. Раптово під час кашлю з'явилося кровохаркання. Яке незалежне втручання виконає медична сестра?

- A** *Покласти міхур з льодом на грудну клітку
- B** Покласти гірчичники на грудну клітку
- C** Поставити банки
- D** Зробити масаж грудної клітки
- E** Зігріваючий компрес

7

Медична сестра супроводжує пацієнта на рентгенологічне дослідження шлунку. Діагностовано – рак. Пацієнт запитує про результати дослідження. Що відповість пацієнту медична сестра?

- A** *Порадить звернутися до лікаря
- B** Скаже справжній діагноз
- C** Промовчить
- D** Заспокоїть хворого
- E** Скаже неправдивий діагноз

8

Хворий у коматозному стані, дихає через трахеостому. Чергова медсестра реанімаційного відділення помітила, що дихання в нього стало частішим, з'явився ціаноз шкіри. Яке незалежне втручання може виконати медична сестра?

- A** *Перевірити прохідність трахеостомічної трубки
- B** Ввести спазмолітики
- C** Попередити западання язика
- D** Ввести серцеві засоби
- E** Налагодити інгаляцію зволоженого кисню

9

Назвіть основний клінічний симптом пухлин м'яких тканин.

- A** * „Плюс – тканини”
- B** Больовий
- C** Загальних ознак
- D** Інтотоксикації
- E** Анемічний

10

Яка проблема може виникнути при видаленні сірчаної пробки із зовнішнього слухового ходу методом промивання?

- A** *Втрата рівноваги
- B** Отогенний сепсис
- C** Отогенний менінгіт
- D** Абсцес мозку та мозочка
- E** Синустромбоз

11

Медичній сестрі очного відділення хворий скаржиться на біль та відчуття стороннього тіла у оці, спостерігається закисання очей. Яку хворобу можливо запідозрити?

- A** *Кон'юктивіт
- B** Кератит
- C** Блефарит
- D** Ірит
- E** Катаракту

12

До медичної сестри хірургічного кабінету звернулась сусідка зі скаргами на локальний біль в ділянці шлунку. З часом біль став інтенсивним. Медична сестра, при проведенні сестринського обстеження хворої, виявила додаткові скарги на нудоту, зниження апетиту та схуднення. Що порекомендує медична сестра пацієнтці?

- A** * Негайно звернутися до онколога або хірурга.
- B** Вживати знеболюючі засоби.
- C** Вживати таблетки церукалу.

D Дотримуватися дієти.

E Пройти ультразвукове обстеження шлунка.

13

Чоловік звернувся до лікувального закладу зі скаргами на болючу припухлість верхньої повіки лівого ока. Об-но: на обмежаній ділянці краю верхньої повіки, припухлість, яка має жовтуватий колір, на вершині пустула, по периферії гіперемія, набряк. Який найбільш ймовірний діагноз?

A *Ячмінь

B Халязіон

C Абсцес

D Флегмона

E Алергічний набряк

14

Яке можливе ускладнення при варикозному розширенні вен:

A *трофічна виразка

B правець

C кардіогенний шок

D печінкова колька

E парези

15

Визначення меж поля зору проводять за допомогою:

A *Периметра

B ТонOMETра Маклакова

C Офтальмоскопа

D Таблиці Головіна-Сівцева

E Щілинної лампи

16

Після введення анестетика в перидуральний простір пацієнту надають положення:

A *З піднятим головним кінцем

B Горизонтальне

C З опущеним головним кінцем

D На спині

E На животі

17

Пальцеве дослідження носоглотки проводиться для діагностики:

A *Аденоїдів

B Гострого тонзиліту

C Гострого фарингіту

D Гострого гаймориту

E Хронічного тонзиліту

18

У хворого 45 років після потрапляння води у вухо раптово погіршився слух, з'явився шум у вусі, відчуття розпирання, аутофонія. Назвіть пріоритетну проблему пацієнта?

A *Сірчана пробка

B Гострий отит зовнішнього вуха

C Стороннє тіло зовнішнього слухового ходу

D Гострий середній катаральний отит

E Гострий середній гнійний отит

19

У пацієнтки 17 років родинка в області гомілки темного кольору, після травматизації почала збільшуватись, мокнути, інколи кровоточити. Больових відчуттів немає. Що Ви порекомендуєте пацієнтці?

- A** *Звернутись до онколога
- B** Змазувати 1\% розчином йодонату
- C** Звернутись до хірурга
- D** Робити пов'язки з левосином
- E** Звернутись до дерматолога

20

Пацієнт 73 років знаходиться на лікуванні в урологічному відділенні. Самостійно рухається, здійснює самогляд, але не може мочитися. Сечовипускання здійснюється через постійний катетер. Яку фізіологічну проблему на II етапі медсестринського процесу повинна виявити медсестра у пацієнта?

- A** *Ризик розвитку інфекції сечових шляхів
- B** Неможливість самостійно рухатися
- C** Неадекватна рухова активність
- D** Страх перед нетриманням сечі
- E** Ризик утворення пролежнів шкіри

21

Серцево-легеневу реанімацію застосовують при термінальних станах, вкажіть один з них:

- A** *Клінічна смерть
- B** Агонія
- C** Преагонія
- D** Післяопераційний період
- E** „Соціальна смерть”

22

Ускладнення виразкової хвороби шлунку, що потребує негайної операції:

- A** *Перфорація виразки
- B** Субкомпенсований стеноз
- C** Некомпенсований стеноз
- D** Пенетрація виразки
- E** Шлунково-кишкова кровотеча

23

В анамнезі рана в ділянці стопи. Рана загоїлася, через деякий час у хворого виникло посмикування жувальних м'язів, судоми всього тіла, „сардонічна посмішка”, опістотонус. Що з хворим?

- A** *Правець
- B** Інфікована рана
- C** Сказ
- D** Газова гангрена
- E** Гнилісна інфекція

24

На прийомі в офтальмолога пацієнт з ознаками лусочкового блефариту. Реалізуючи IV етап медсестринського процесу медсестра повинна

- A** *Обробити краї повік діамантовим зеленим
- B** Обробити краї повік розчином дімедролу
- C** Обробити краї повік розчином анальгін
- D** Обробити краї повік розчином дексаметазону
- E** Обробити краї повік розчином атропіну

25

На прийомі в офтальмолога пацієнт з діагнозом зріла катаракта. При цьому медсестра встановлює наступний медсестринський діагноз

- A** Зниження гостроти зору
- B** Випадіння з поля зору
- C** Гнійні виділення з ока
- D** Біль ока, голови
- E** Звуження поля зору

26

Пацієнт, який впродовж 5 років працює на пиломілі, звернувся зі скаргами на зниження слуху, шум у вусі. Медсестра повинна підготувати пацієнта до:

- A** *аудіометрії
- B** отоскопії
- C** діафаноскопії
- D** рентгенографії вуха
- E** вестибулометрії

27

Після випадкового вживання невідомої рідини пацієнт скаржиться на біль в животі та гомілкових м'язах, порушення зору, блювання. Артеріальний тиск знижений, розвивається гіпертонус м'язів. Такі симптоми характерні для отруєння:

- A** *Метанолом
- B** Етанолом
- C** Опіатами
- D** Фосфорорганічними сполуками
- E** Ацетатною кислотою

28

До лікаря звернулася пацієнтка зі скаргами на виділення крові із соска при натисканні на праву молочну залозу. До якого обстеження з метою уточнення діагнозу медична сестра підготує пацієнтку

- A** *Мамографії
- B** Томографії
- C** Сцинтиграфії
- D** Ангіографії
- E** Сонографії

29

Ефективність зовнішнього масажу серця по пульсу на сонній артерії потрібно перевіряти кожних:

- A** 2 хв
- B** 3 хв
- C** 5 хв
- D** 8 хв
- E** 10 хв

30

Невідкладна допомога при нирковій колиці.

- A** *Введення баралгіну
- B** Холод на поперек
- C** Назначення діуретиків
- D** Введення натрію хлориду
- E** Введення глюкозидів

31

Найбільш інформативний метод діагностики виразкової хвороби шлунка.

- A** *Фіброгастроскопія
- B** Рентгеноскопія
- C** Лапароскопія
- D** УЗД
- E** Сканування

32

Збільшення діастази сечі характерно для:

- A** *гострого панкреатиту
- B** гострого апендициту
- C** защемленої грижі
- D** проривної виразці шлунку
- E** для інвагінації

33

У ЛОР-відділення поступив хворий з переломом кісток носа, носовою кровотечею. Які інструменти необхідно підготувати медичній сестрі?

- A** * Носове дзеркало, носові елеватори
- B** Кровозупинні затискачі, скальпель
- C** Пінцет, кровозупинні затискачі
- D** Шпатель, кровозупинні затискачі
- E** Корнцанг, роторозширювач

34

При гострій затримці сечі в післяопераційному періоді використовують:

- A** *катетеризацію сечового міхура
- B** холод на лоно
- C** внутрішньовенно глюкозу
- D** внутрішньовенно натрію хлорид 10%
- E** внутрішньовенно еуфілін

35

Вкажіть співвідношення ШВЛ до закритого масажу серця при проведенні серцево-легеневої реанімації одним реаніматором.

- A** 2 :15
- B** 2 :12
- C** 1: 5
- D** 1:10
- E** 2 :10

36

Симптом "переміжної кульгавості" характерний для захворювання:

- A** *Облітеруючий ендартеріїт
- B** Флеботромбоз.
- C** Флебит.
- D** Ревматоїдний артрит.
- E** Тромбофлебіт

37

Перша допомога при відкритому пневмотораксі:

- A** *Накладання оклюзійної пов'язки

- B** Дренаж по Суботіну.
- C** Протикашлеві препарати.
- D** Плевральна пункція
- E** Введення наркотиків.

38

До передракових захворювань прямої кишки відноситься:

- A** *Поліпоз прямої кишки.
- B** Парапроктит.
- C** Хронічний коліт.
- D** Сигмоїдит.
- E** Випадіння прямої кишки

39

Що характерне для перфоративної виразки 12-палої кишки?

- A** *Раптовий "кинджальний біль".
- B** Оперізуючий біль.
- C** Симптом Пастернацького.
- D** Блювання "кавовою гущею".
- E** Метеоризм.

40

Лікворея виникає при:

- A** *Переломі основи черепа.
- B** Забої головного мозку.
- C** Пораненні склепіння черепа.
- D** Струсі головного мозку.
- E** Здавленні головного мозку.

41

Хворий скаржиться на біль в оці і відповідній половині голови, значне зниження зору, нудоту, блювання. Внутрішньоочний тиск 60 мм рт ст. Відображена картина дозволяє запідозрити:

- A** * Гострий напад глаукоми
- B** Гострий іридоцикліт
- C** Повзучу виразку рогівки
- D** Метагерпетичний кератит
- E** Кератокон'юнктивіт

42

Хворий знаходиться на диспансерному обліку з приводу глаукоми. Яким методом можна визначити рівень внутрішньоочного тиску?

- A** *Тонометрії
- B** Візометрії
- C** Периметрії
- D** Кампіметрії
- E** Офтальмоскопії

43

У хворого проникаюче поранення ока. Профілактику якого захворювання Вам необхідно провести?

- A** * Правця
- B** Чуми
- C** Бешихи
- D** Сифілісу
- E** Токсоплазмозу

44

В комбустиологічне відділення привезли пацієнта з опіком IV ступеня. Виберіть ознаку, яка характеризує цей ступінь:

- A** * Обвуглення
- B** Еритема шкіри
- C** Некроз епідермісу
- D** Некроз дерми
- E** Наявність пухирів

45

Медична сестра поставила діагноз "синдром гострого живота". Яке захворювання може бути у пацієнта:

- A** * Перфоративна виразка шлунку
- B** Гастрит
- C** Ниркова колька
- D** Апендикулярний інфільтрат
- E** Гострий коліт.

46

У пацієнта відкритий перелом, який супроводжується артеріальною кровотечею. Що медична сестра спочатку застосує:

- A** * Кровозупинний джгут Есмарха
- B** Асептичну пов'язку
- C** Транспортну іммобілізацію
- D** Кровозупинні засоби
- E** Знеболюючі

47

У хворого перелом ключиці без зміщення відламків. Яку пов'язку повина накласти медична сестра в даному випадку:

- A** * Дезо
- B** Колосоподібну
- C** Поворотну
- D** Спіральну
- E** Черепащачу

48

У хворого розтягнення зв'язок гомілково-ступневого суглоба. Яку пов'язку застосує медична сестра в даному випадку:

- A** * Хрестоподібну
- B** Черепащачу
- C** Зворотню
- D** Повзучу
- E** Колосовидну.

49

Медичні сестри при масивних переливаннях крові проводять профілактику цитратного шоку пацієнтам. Що вони при цьому застосовують:

- A** * Розчин хлористого кальцію
- B** Нітрогліцерин
- C** Новокаїн
- D** Антибіотики
- E** Поліглюкін

50

Медична сестра спостерігає за вимірюванням центрального венозного тиску у хворого. Вкажіть нормальні показники цього дослідження:

- A** *30-60 мм вод. ст.
- B** 100-120 мм вод. ст.
- C** 10-20 мм вод. ст.
- D** 0-10 мм вод. ст.
- E** 200-220 мм вод. ст.

51

Медичній сестрі необхідно відібрати апарат для вимірювання центрального венозного тиску. Вкажіть його назву:

- A** *Апарат Вальдмана
- B** Апарат Амбу
- C** Апарат Ілізарова
- D** Апарат РДА-1
- E** Апарат Ціто

52

Хворому з отруєнням лікар призначив етиловий спирт. Специфічним антидотом якої отрути він являється:

- A** * Метилового спирту
- B** Діхлоретану
- C** Фосфорорганічних сполук
- D** Монооксиду вуглецю
- E** Морфіну

53

Один реаніматор проводять легенево-серцеву реанімацію. З якою частотою він повинен її проводити:

- A** *2:15
- B** 1:15
- C** 1:5
- D** 2:5
- E** 2:8

54

У хворого із закритою травмою живота виявлено внутрішню кровотечу. Яку допомогу слід надати хворому?

- A** * Покласти холод на живіт і викликати "швидку допомогу".
- B** Дати випити холодної лужної мінеральної води.
- C** Дати спазмолітики.
- D** Направити на консультацію до хірурга в поліклініку.
- E** Покласти холод на живіт, дати знеболюючі препарати.

55

До медичної сестри звернувся пацієнт з відмороженням II ступеня. Назвіть його характерну ознаку?

- A** * Утворення пухирців.
- B** Зворотня судинна реакція.
- C** Некроз епідермісу.
- D** Некроз всієї товщі шкіри.
- E** Некроз всієї товщі шкіри і кісток.

56

При проведенні закритого масажу серця точка натискання знаходиться:

- A** * На межі нижньої та середньої третини грудини.
- B** На рукоятці грудини.
- C** На мечовидному відростку.
- D** Зліва від грудини в проекції серця.
- E** Справа від грудини в 2-му міжребір'ї.

57

Вкажіть препарат крові, який застосовується для зупинки кровотечі:

- A** * Фібриноген
- B** Фібринолізин
- C** Полібіолін
- D** Альбумін
- E** Протеїн

58

Пацієнту з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею, наклали джгут, ввели знеболюючі препарати. Що буде наступним етапом у веденні пацієнта?

- A** * Накладання захисної асептичної пов'язки на рану
- B** Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
- C** Холод на місце травми
- D** Імобілізація пошкодженої кінцівки
- E** Надання хворому зручного положення

59

Хворий 35 р., скаржиться на швидку втомлюваність під час ходи, ниючі болі в литках, похолодання стоп. Палить упродовж 16 років. Шкіра стоп і гомілок бліда. Пульсація на тильних артеріях стоп різко ослаблена. До лікаря звертатися не хоче. Що може порадити медична сестра в першу чергу?

- A** * Відмовитись від паління
- B** Обмежити ходу
- C** Теплі ножні ванни
- D** Масаж нижніх кінцівок
- E** УВЧ-терапію