

Крок M Лікувальна справа

Невідкладні стани в педіатрії

1

Після ін'єкції інсуліну у дівчинки 1.2 років змінився стан, шкіра бліда, вкрита холодним липким потом, раптово почались судоми. Надайте невідкладну допомогу:

A розчин глюкози 20% - 40 мл в/в

B ізотонічний розчин натрію хлориду 1.00 мл крапельне внутрішньовенне

C інсулін 1.5-20 ОД

D краплинне введення 4% бікарбонату натрію 1.00 мл

E Преднізолон

2

Підберіть препарат, який входить до складу невідкладної допомоги при судорогах на фоні спазмофілії:

A глюконат кальцію

B відехол

C анальгін

D ергокальціферол

E евфілін

3

Дитину, 2 років, за праву долоню вкусила комаха, на місці укусу з'явилося почервоніння, поширилося набряк тканин. Температура тіла підвищилася до 38°C. Такий стан діагностують у разі:

A набряку Квінке

B кропив'янки

C анафілактичного шоку

D сінної гарячки

E молочного струпу

4

Фельдшер прибув до дитини 12 років, у якої після ін'єкції інсуліну почалися судоми. При огляді: дитина непритомна, шкіра бліда, волога, спостерігається ригідність м'язів.

Підберіть препарат для надання допомоги:

A * 40% розчин глюкози

B Інсулін

C Еуфілін

D Кофеїн

E Ефедрин

5

До фельдшера ФАПу звернулися батьки з дитиною 5 років, яка скаржиться на головний біль, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: слизисті виділення з носа, гіперемія кон'юнктиви та шкірних покривів, температура 39°C. Для зниження температури тіла з фізичних методів необхідно застосувати:

A * Прохолодна клізма

B Тепла грілка

C Гаряче пиття

D Лужна інгаляція

E Оксигенотерапія

6

Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до дитини 5 місяців, яка хворіє на кашлюк.

Під час приступу кашлю виник ціаноз обличчя, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів на хвилину необхідно провести при виконанні штучного дихання?

A *25

B 100

C 15

D 80

E 10

7

Фельдшера ФАПу викликали до хлопчика, який хворіє цукровим діабетом. При огляді: свідомість відсутня, шкірні покриви бліді, вологі, спостерігається тризм жувальних м'язів, судом, зіниці розширені. Якому стану відповідають дані клінічні симптоми?

A * Гіпоглікемічна кома

B Непритомність

C Анафілактичний шок

D Гіперглікемічна кома

E Колапс

8

Фельдшер ФАПу з дозволу лікаря проводив щеплення вакциною АКДП в/м. Після ін'єкції стан дитини раптово погіршився шкіра бліда, пульс слабкий, АТ знижений. Дитина знепритомніла. Якому невідкладному стані відповідають дані симптоми?

A * Анафілактичний шок

B Ларингоспазм

C Колапс

D Непритомність

E Серцева астма

9

Фельдшер прибув на виклик до хлопчика на виклик, який одержує інсулін. Скарги на запаморочення сонливість. При огляді шкіра суха, гіпотонус м'язів, запах ацетону з рота, пульс слабкий. Підберіть препарат для надання невідкладної допомоги:

A *Інсулін

B Кофеїн

C Седуксен

D Глюкоза

E Адреналін

10

До фельдшера ФАПу звернувся хлопчик 12 років, який порізав палець склом. Під час перев'язки, побачивши кров, зблід і раптово втратив свідомість. Пульс ниткоподібний, кінцівки холодні. Який стан виник у дитини?

A * Непритомність

B Геморагічний шок

C Гостра серцева недостатність

D Колапс

E Гостра дихальна недостатність

11

У дитини 2 років з гіпертермічним синдромом, спостерігається блідість шкірних покривів, озноб, холодні на дотик кінцівки. Що слід застосувати для поліпшення мікроциркуляції судин?

A Папаверин 2% внутрішньом'язево

B Оцтові обгортання

C Аналгін 50% внутрішньо-м'язево

D Холод на проекцію великих судин

E Парацетамол всередину

12

Які пероральні засоби для зниження температури тіла є препаратами вибору для дітей?

A Парацетамол, ібупродзен

B Аспірин

C Анальгін

D Сібазон

E Ацелізин

13

У дитини 1 року, яка лікується з приводу рапіту на фоні задовільного самопочуття раптово виникли клоніко-тонічні судоми. Який препарат застосовують для надання невідкладної допомоги?

A Глюконат каліцію

B Сібазон

C Сульфат магнію

D Лазікс

E діазелам

14

У дитини 5 років, яка хворіє ГРВІ раптово вночі з'явився сухий кашель, інспіраторна задишка, захрип голос. Яке ускладнення можна запідоозрити?

A Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

B Гострий обструктивний бронхіт

C Справжній круп

D Бронхіальна астма

E Епіглотид

15

Які основні принципи надання невідкладної допомоги при стенозі гортані I ступення?

A Відволовкаюча терапія, парові інгаляції

B Гормональна терапія

C Штучна вентиляція легень

D Трахеотомія

E Інкубация трахеї

16

До фельдшера ФАПу привили дівчинку 7 років, яку під час прогулянки вжалила оса. При огляді у ділянці правого плеча спостерігається біль, гіперемія, набряк. Які дії фельдшер повинен провести першочергово?

A *Обробити місце вжалення спиртом, прикласти холод

B Видалити пінцетом жало

C Дати кисень

D Ввести 2 мл 0,5% розчину новокаїну у місце вжалення

E Ввести 0,5 мл 0,5% розчину строфантину в/в

17

Фельдшер ФАПу дитині 3 років зробив ін'екцію цефазоліну в/м. Стан дитини різко погіршився, з'явилось відчуття жару, на шкірі тулуба поширився алергійний висип, знизвися АТ, дитина втратила свідомість. Визначте діагноз

A *Анафілактичний шок .

B Поліморфна еритема

C Крапивниця

D Ангіоневротичний набряк

E Атопічний дерматит

18

Фельдшера ШМД викликали до дитини 2 років, яка скаржиться на головний біль, виражену загальну слабкість. При огляді: слизові виділення з носу, гіперемія шкіри і

кон'юнктив очей, температура тіла 39,5°C. З яких дій фельдшер повинен розпочати надавати допомогу?

- A** *Роздягнути дитину і розтерти шкіру напівспиртовим розчином
- B** Зігріти дитину грілками
- C** Ввести дитині підшкірно розчин кордіаміну
- D** Ввести дитині преднізолон
- E** Ввести дитині розчин папаверину

19

Фельдшера ШМД викликали до дитини 12 років, яка знепритомніла під час написання контрольної роботи. Першочергові дії фельдшера.

- A** *Надати дитині горизонтальне положення, піднявши нижні кінцівки під кутом 30°- 45°
- B** Положити дитину набік
- C** Посадити дитину з трохи нахиленою вперед головою
- D** Надати дитині підвищене положення
- E** Надати дитині горизонтальне положення з опущеними кінцівками

20

Виклик фельдшера ФАПу до дитини 1 року, яка хворіє на парагрип. Вночі стан дитини погіршився: з'явилась задишка, шумне дихання з участю допоміжної мускулатури у акті дихання, "тавкаючий" кашель, охриплій голос. Чим ускладнився парагрип?

- A** *Стенозуючим ларинготрахеїтом
- B** Ларингоспазмом
- C** Вогнищевою пневмонією
- D** Серцевою недостатністю
- E** Нападом бронхіальної астми

21

Виклик фельдшера ШМД до дитини 7 років, у якої розвився колапс після фізичного навантаження на уроці фізкультури. Вчитель поклав дитину у горизонтальне положення, підняв кінцівки, розстебнув одяг. Визначте подальші дії фельдшера

- A** *Ввести п/ш розчин кордіаміну
- B** Надати дитині підвищене положення
- C** Положити дитину набік
- D** Ввести в/м 50% розчин анальгіну
- E** Протерти шкіру розчином оцту

22

До фельдшера ШМД звернулись батьки дитини 2-х років в зв'язку з тим, що дитину вкусила комаха за праву долоню. На місці укусу з'явилося почервоніння, поширилося набряк тканин. Температура тіла підвищилась до 38°C. Такий стан діагностують у разі:

- A** Набряку Квінке
- B** Анафілактичного шоку
- C** Кропив'янки
- D** Сінної гарячки
- E** Молочного струпу

23

У хлопчика 5 років через 10 хв. після вжалення бджоли з'явились неспокій, гіперемія та зуд шкіри обличчя, нудота, свистяче дихання, ринорея, потім втрата свідомості, блідість, пітливість. Ви встановили діагноз: анафілактичний шок. Визначте препарат, який слід ввести дитині у разі анафілактичного шоку.

- A** Преднізолон
- B** Аналгін
- C** Еуфілін
- D** Корглікон
- E** Фуросемід

24

Мати 7-річного хлопчика звернулась до фельдшера ШМД зі скаргами на різке погіршення стану дитини. При огляді дитина збуджена, вимушене положення сидячи, експіраторна задишка, в кінці нападу відходження скловидного мокротиння. Вкажіть діагноз.

- A** Бронхіальна астма
- B** Пневмонія
- C** Стенозуючий ларингіт
- D** Гострий бронхіт
- E** Кашлюк

25

Дитина 5 років отруїлась невідомою речовиною. Фельдшер ШМД для негайного промивання шлунку використає воду, одноразова кількість якої складає:

- A** 300-350 мл
- B** 100-110 мл
- C** 150-180 мл
- D** 200-250 мл
- E** 40-50 мл

26

Фельдшер ШМД приїхав на виклик до дівчинки 10 років, яка хворіє на цукровий діабет. Через порушення дієти її стан погіршився: шкіра бліда, суха, запах ацетону з рота, гіпотонус м'язів, дихання глибоке, "шумне", пульс частий, артеріальний тиск низький. Визначне стан.

- A** Гіперглікемічна кома
- B** Гіпоглікемічна кома
- C** Печінкова кома
- D** Іремічна кома
- E** Ацетонемічна кома

27

Фельдшер діагностував у дитини клінічну смерть. Які заходи він повинен провести в першу чергу при первинній серцево-легеневій реанімації?

- A** Відновити прохідність дихальних шляхів
- B** Провести непрямий масаж серця
- C** Ввести медикаменти
- D** Провести дефібриляцію
- E** Провести ШВЛ

28

Дитина віком 1 року проковтнула декілька невідомих таблеток. Лікар призначив провести промивання шлунку. Скільки рідини одномоментно Ви повинні ввести?

- A** 150 – 200 мл
- B** 40 – 50 мл
- C** 60 – 90 мл
- D** 300 – 350 мл
- E** 450 – 500 мл

29

В оздоровчому таборі діти з молодшого загону під час прогулянки знайшли гриби та з'їли їх. Які заходи треба провести першочергово в цьому випадку?

- A** Промити шлунок 5% розчином натрію хлориду
- B** Ввести обволікальні препарати – вазелінову олію
- C** Ввести ентеросорбенти – активоване вугілля

- D** Провести очисну клізму
E Виміряти температуру тіла

30

У дитини 7-ми місяців раптово почалися судоми. Лікується в інфекційній лікарні з діагнозом: менінгококова інфекція. Які першочергові дії фельдшера при наданні невідкладної допомоги?

- A** Провести профілактику западання язика
B Подразнювати корінь язика
C Зігріти дитину грілками
D Повісити міхур з льодом до голови
E Провести ШВЛ, закритий масаж серця

31

У дитини 3-х років діагностовано діабетичну кому. Із якого способу введення інсуліну розпочнеться невідкладна допомога при даній комі?

- A** Внутрішньовенно струминно
B Внутрішньовенно краплинно
C Внутрішньом'язово
D Підшкірно
E Внутрішньошкірно

32

У 9-річної дитини, хворої на цукровий діабет відсутня свідомість, наявний загальний тремор, підвищення м'язового тонусу, блідість на вологість шкіри. Що можна запідозрити?

- A** *Гіпоглікемічку кому
B Печінкову кому
C Ниркову кому
D Гіперглікемічну кому
E Мозкову кому

33

У дитини при різкому зниженні температури тіла виникла слабкість, блідість шкіри, кінцівки стали холодні, шкіра вкрилась холодним липким потом. Дитина втратила свідомість, артеріальний тиск різко знизився. Який препарат слід ввести першочергово.

- A** *0,1% р-н адреналіну гідрохлориду
B 0,5% р-н седуксену
C Інсулін
D 40% глукозу
E 1% р-н димедролу

34

У дитини на тлі менінгококового менінгіту розвинулись судоми. Якої невідкладної допомоги потребує дитина?

- A** *Забезпечити прохідність дихальних шляхів і ввести 0,5% р-н седуксену
B Покласти дитину на живіт та ввести 50% р-н анальгіну
C Провести відволікачу терапію
D Провести трахеотомію
E Ввести дитині літічну суміш

35

Ви надаєте допомогу ВІЛ-інфікованій дитині. Які критичні ситуації створюють найбільший ризик передачі ВІЛ – інфекції?

- A** * Зупинка дихання та проведення штучного дихання рот до рота
B ЕКГ контроль порушення серцевого ритму

C Зупинка дихання та проведення ШВЛ за допомогою мішка та маски

D Проведення непрямого масажу серця

E Пальпація живота

36

5-місячна дитина хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Якої допомоги потребує дитина?

A *Подразнити корінь язика, при неефективності ШВЛ

B Провести лужні інгаляції

C Відвілікаюча терапія

D Інтубація трахеї

E Відсмоктати слиз з верхніх дихальних шляхів

37

У дитини 8-ми місяців виникла раптова зупинка дихання, ціаноз шкіри, дитина вкрита липким потом, "півнячий крик". З чого слід розпочати надання невідкладної допомоги?

A *Натиснути на корінь язика

B Зробити прохолодну клізму

C Ввести внутрішньом'язово 50% р-н анальгіну

D Ввести 1% розчин нікотинової кислоти підшкірно

E Ввести внутрішньовенно преднізолон

38

У дитини при нападі БА поверхневе дихання з різко утрудненим видихом, наростає ціаноз, акроціаноз. Ефекту від використання сальбутамолу та еуфіліну немає. Що необхідно призначити?

A *3% преднізолон 2-3 мг/кг

B 2% супрастин 1-2 мг/кг

C 5% р-н аскорбінової кислоти 0, 2 мл/кг

D 1% дімедрол -1 мг/кг

E 50% анальгін- 0,1 мл/рік життя

39

У новонародженої дитини спостерігаються: ціаноз шкіри, слабкий крик, поверхневе нерівномірне дихання, ps – 56/хв, м'язовий тонус знижений, кінцівки зігнуті. При проведенні непрямого масажу подушечки двох великих пальців розташовані на груднині дитини. Вкажіть найчастіше ускладнення, яке може виникнути при покладанні рук фельдшера на мечоподібний відросток при здійсненні даної реанімації.

A *Ушкодження печінки

B Перелом ребер

C Гематома грудної клітки

D Відкритий пневмоторакс

E Гостра емфізема

40

До фельдшера ФАПу, звернулась мати з 3-ох річною дитиною, зі слів матері її дитина приблизно 45 хвилин тому випадково з'їла 8 таблеток тазепама. Батьками ніяких медичних втручань не проводилось. Ваші дії?

A *Промивання шлунка до чистих промивних вод

B Очисна клізма

C Спостереження

D В/в краплини 0,9% розчин натрію хлориду

E Госпіталізація у відділення інтенсивної терапії

Файл: Невідкладні стани в педіатрії.doc
Каталог: C:\WINDOWS\system32
Шаблон: C:\Documents and Settings\User\Application
Data\Microsoft\Шаблоны\Normal.dotm
Заголовок:
Содержание:
Автор: Admin
Ключевые слова:
Заметки:
Дата создания: 30.04.2014 9:57:00
Число сохранений: 2
Дата сохранения: 30.04.2014 9:57:00
Сохранил: Admin
Полное время правки: 0 мин.
Дата печати: 12.05.2014 8:28:00
При последней печати
страниц: 7
слов: 2 040 (прибл.)
знаков: 11 630 (прибл.)