

Крок М Сестринська справа
Невідкладні стани в хірургії

1

У хворого на пахвинну грижу 1 годину тому після підняття вантажу з'явився біль у ділянці грижового утворення і воно перестало вправлятися у черевну порожнину. Які заходи невідкладної допомоги повинна виконати медсестра?

- A** * Викликати "швидку допомогу"
- B** Ввести розчин анальгін у внутрішньом'язово
- C** Ввести розчин но-шпи внутрішньом'язово
- D** Спробувати самостійно вправити грижу
- E** Покласти грілку на ділянку грижі

2

У хворого на виразкову хворобу виникло блювання у вигляді кавової гущі і чорні рідкі випорожнення. Яку невідкладну допомогу повинна надати медсестра до приходу лікаря?

- A** * Покласти міхур з льодом на живіт
- B** Промити шлунок холодною водою
- C** Промити шлунок розчином перманганату калію
- D** Дати ковтати хворому шматочки льоду
- E** Ввести розчин церукалу внутрішньом'язово

3

У хворого 50 р. загальний стан важкий, спутана свідомість, артеріальний тиск не визначається, пульс відсутній на периферичних артеріях, визначається тільки на сонних, стегнових артеріях, по серцевих скороченнях, шкірні покриви - бліді, ціаноз. Що можна запідозрити у хворого?

- A** * Предагонію
- B** Агонію
- C** Клінічну смерть
- D** Колапс
- E** Запаморочення

4

В клініку доставлений хворий 25 р. після ДТП - свідомість і очні рефлекси відсутні. Артеріальний тиск і пульс на периферичних артеріях не визначається. Пульс на сонних артеріях слабого наповнення. Тони серця глухі. Дихання рідке. Як Ви оцінюєте стан хворого?

- A** * Агонія
- B** Предагонія
- C** Запаморочення
- D** Клінічна смерть
- E** Колапс

5

Хворий 1 хв. тому раптово перейшов в стан, який характеризується відсутністю функції центральної нервової системи, дихання та серцевої діяльності, відсутністю видимих проявів життя. Як Ви оцінюєте стан хворого?

- A** * Клінічна смерть
- B** Колапс
- C** Запаморочення
- D** Агонія
- E** Предагонія

6

На троллейбусній зупинці знайдена людина 40-45 років. Викликана машина "швидкої допомоги". У відповідь на больове подразнення відкриває очі, при сильному подразненні захисна реакція, при звертанні вимовляє незв'язні слова. Як Ви оціните глибину розладу

свідомості у хворого?

- A** * Сопор
- B** Ясна свідомість
- C** Приголомшений
- D** Кома
- E** Смерть мозку

7

Пацієнт, після тяжкої черепно-мозкової травми, знаходиться у коматозному стані, дихає через трахеостому. Чергова медична сестра помітила, що дихання у нього стало частішим, з'явився ціаноз шкіри. Визначте наявну проблему пацієнта:

- A** * Обтурація трахеостомічної трубки
- B** Западання язика
- C** набряк легень
- D** Ларингоспазм
- E** Спонтанне дихання

8

Потерпілого чоловіка, 24 років, після ДТП до приймально-діагностичного відділення доставили з множинними ушкодженнями. Чергова медична сестра виявила, що пацієнт без свідомості, дихання поверхневе, пульс ниткоподібний, зіниці звужені. Першочергове незалежне медсестринське втручання.

- A** * Викликати лікаря
- B** Виміряти АТ
- C** Зібрати сечу на аналіз
- D** Транспортувати до рентгенкабінету
- E** Зняти ЕКГ

9

Медична сестра відділення реанімації та інтенсивної терапії за призначенням лікаря проводить інтенсивну медикаментозну терапію. Визначити найбільш ефективний шлях введення інфузійних засобів:

- A** * Внутрішньовенний
- B** Внутрішньом'язовий
- C** Підшкірний
- D** Внутрішньосерцевий
- E** Внутрішньоартеріальний

10

У жінки опік окропом передньої поверхні грудей, живота та ніг. Скарги на сильний біль. Шкіра гіперемована, набрякла. Яке сестринське втручання є доцільним на догоспітальному етапі?

- A** * Охолодити, накласти асептичну пов'язку
- B** Підсікти пухирі та накласти пов'язку
- C** Порадити застосувати грілку
- D** Накласти мазеву пов'язку
- E** Накласти оцтовий компрес

11

Чоловік в стані алкогольного сп'яніння випадково взяв в рот декілька мл оцтової кислоти. Турбує біль. Ротова порожнина гіперемована. Що в перше чергу повинна зробити медсестра?

- A** * Ретельно промити рот водою
- B** Дати випити гарячого молока
- C** Дати випити холодного молока
- D** Дати ковтати шматочки льоду
- E** Ввести в шлунок тонкий зонд.

12

Пацієнт отримав травму грудної клітки. Положення вимушене, у 4 міжребер'ї зліва різана рана 3x1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. Ви наклали окклюзійну пов'язку. Яке її функціональне призначення?

- A** *Герметизація рани
- B** Захист від інфікування
- C** Усунення деформації
- D** Зупинка кровотечі
- E** Транспортна іммобілізація

13

До Вас звернувся сусід, який скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, затримку газів і стільця. При огляді Ви запідозрили "гострий живіт". Як надати долікарську допомогу?

- A** *Покласти холод на живіт, викликати "швидку допомогу"
- B** Знеболити, покласти грілку на живіт
- C** Промити шлунок, поставити очисну клізму
- D** Знеболити, спостерігати за пацієнтом протягом 3-х годин
- E** Обмежити прийом їжі та води, ввести спазмолітики

14

В хірургічному відділенні у хворого раптово зупинилось дихання, відсутній пульс та АТ, зіниці широкі, не реагують на світло. Йому негайно почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Який показник свідчить про ефективність реанімації?

- A** *Поява пульсу на сонній артерії
- B** Блідість шкіри
- C** Розширення зіниць
- D** Відсутність пульсу на магістральних судинах
- E** Відсутність свідомості

15

У потерпілого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ви виявили відсутність дихання, пульса на сонній артерії, широкі зіниці. Що в першу чергу треба зробити?

- A** *Розпочати серцево-легеневу реанімацію
- B** Дати вдихнути нашатирного спирту
- C** Викликати "швидку допомогу"
- D** Викликати міліцію
- E** Ввести хлористий кальцій

16

У хворого з напруженим пневмотораксом з'явилися симптоми порушення гемодинаміки. Яка причина цього порушення?

- A** *Зміщення органів середостіння
- B** Гіповолемія
- C** Метаболічний ацидоз
- D** Метаболічний алкалоз
- E** Повітряна емболія

17

За статистичними даними отруєння якою речовиною є найбільш частою причиною смерті?

- A** *Алкоголем
- B** Чадним газом
- C** Кислотами
- D** Лугами

E Барбітуратами

18

У 67 річного чоловіка під час проведення нейрохірургічної операції з'явилося порушення ритму серця. Фармакологічні засоби якої групи потрібно ввести хворому для нормалізації ритму серця?

- A** *антиаритмічні
- B** серцеві глікозиди
- C** гормони
- D** дихальні аналептики
- E** антигістаміни

19

Назвіть показання до екстреної профілактики правця

- A** *позагоспітальні аборти
- B** фурункул
- C** бешиха
- D** термічні опіки 1 ст
- E** відмороження 1 ст

20

Яке ускладнення найчастіше зустрічається при переломі кісток носа?

- A** *кровотеча
- B** риніт
- C** гайморит
- D** фронтит
- E** озена

21

Лікарем поставлений діагноз „Кровотеча із вен стравоходу”, який інструмент має підготувати медсестра для зупинки кровотечі із вен стравоходу

- A** *Зонд Блекмора
- B** Назогастральний зонд
- C** Катетер Фолєя
- D** Затискач Кохера
- E** Затискач Мікуліча

22

При падінні з висоти хворий отримав закритий перелом обох нижніх кінцівок в ділянці гомілок. Надайте невідкладну допомогу.

- A** *Накладання транспортних шин
- B** Накладання джгута
- C** Накладання скелетного витягу
- D** Накладання гіпсової пов'язки
- E** Накладання тиснучої пов'язки

23

При переливанні однокрупної, резус-сумісної крові у хворого з'явилися скарги на біль у поперековій ділянці, важкість при диханні, серцебиття, біль за грудиною. Ваші дії.

- A** *Припинити переливання крові, викликати лікаря
- B** Припинити переливання крові, ввести 50% 2 мл анальгін
- C** Припинити переливання крові, дати таблетку валідолу під язик
- D** Припинити переливання крові, спостерігати за хворим
- E** Заспокоїти хворого і продовжити переливання крові

24

До лікаря звернувся хворий з різаною раною передньої поверхні передпліччя, з якої витікає темно-червона кров. Що повинна виконати медична сестра за призначенням лікаря для тимчасової зупинки кровотечі?

- A** * Накладання тиснучої пов'язки
- B** Згинання кінцівки в суглобі
- C** Накладання артеріального джгута
- D** Накладання затискача
- E** Електрокоагуляція

25

Під час приймання їжі потерпілий раптово перервав енергійну розмову на півслові, схопився на ноги, руки судомно охоплюють шию, обличчя синіє і набрякає на очах. Ви повинні в першу чергу виконати наступні дії:

- A** * Застосувати прийом Геймліха
- B** Здійснити конікотомію
- C** Проводити штучну вентиляцію легень методом „з рота в рот”
- D** Намагатись проштовхнути стороннє тіло глибше в дихальні шляхи
- E** Здійснити трахеотомію

26

Дві хвилини тому електрик отримав удар електричним струмом. Хворий непритомний, пульс над сонною артерією не визначається, зіниці розширені, не реагують на світло. Ваші дії:

- A** * негайно розпочати серцево – легеневу реанімацію
- B** Дати понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом
- C** Розпочати непрямий масаж серця
- D** Ввести в/в 1% розчин адреналіну
- E** Чекати на прибуття реанімаційної бригади

27

Ознакою перфорації виразки шлунка вважається:

- A** * Раптовий кинджальний біль в животі
- B** Симптом Ортнера
- C** Метеоризм
- D** Підвищення температури тіла
- E** Позитивний симптом Ровзінга

28

Вы оказываете помощь пострадавшему с электротравмой. Пострадавший без сознания, держится за электрический провод. С чего необходимо начинать оказывать помощь?

- A** * освободить пострадавшего от действия электрического тока
- B** провести ИВЛ
- C** провести непрямой массаж сердца
- D** вызвать скорую помощь
- E** дать понюхать нашатырный спирт

29

Вы медсестра здравпункта. Вас вызвали к пострадавшему с проникающим ранением грудной клетки. Состояние больного тяжелое. При осмотре из раны выделяется пенная кровь. Какой тип повязки запланирует медсестра для оказания первой медицинской помощи?

- A** * окклюзионную
- B** спиральную
- C** давящую
- D** черепашью

E косыночную

30

Потерпевшего вытащили из воды через 4 минуты после утопления. Пульс на периферической артерии и дыхание отсутствуют. На каких сосудах нужно определить пульс?

- A** * сонная артерия
- B** локтевая артерия
- C** подколенная артерия
- D** брюшная аорта
- E** лучевая артерия

31

При отравлении фосфорорганическими соединениями антидотом является:

- A** * 0,1% раствор атропина сульфата
- B** 0,1% раствор адреналина гидрохлорида
- C** кордиамин
- D** унитиол
- E** строфантин

32

Потерпевший М., 40 лет, с открытым переломом бедра, который осложнился артериальным кровотечением. С целью временной остановки кровотечения может быть применено:

- A** * наложение жгута
- B** давящая повязка
- C** пузырь со льдом
- D** кровоостанавливающие препараты
- E** тугая тампонада раны

33

У хворого під час переливання еритроцитарної маси з'явилися: біль в попереку, відчуття стиснення в грудях, почервоніння обличчя, відчуття "страху смерті", задишка. Об'єктивно: хворий неспокійний, пульс 110 за 1 хв., АТ – 110/80 мм рт.ст. Вкажіть ускладнення переливання крові:

- A** * Гемотрансфузійний шок
- B** Повітряна емболія
- C** Цитратний шок
- D** Анафілактичний шок
- E** Емболія легеневої артерії

34

На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання. Пульс і АТ не визначаються, зіниці на світло не реагують. Який термінальний стан у потерпілої?

- A** * Клінічна смерть
- B** Передагональний стан
- C** Агонія
- D** Колапс
- E** Травматичний шок

35

Для якої черепно-мозкової травми характерний "симптом окулярів"?

- A** * Перелом основи черепа
- B** Струс головного мозку
- C** Перелом склепіння черепа

- D** Стиснення головного мозку
- E** Забій головного мозку

36

У хворого В., 45 р. виявлена травма правого стегна. Пальпаторно - болючість в ділянці нижньої третини стегна, набряк, патологічна рухливість кісток, деформація стегна. Діагностовано закритий перелом в ділянці нижньої третини правого стегна. Як правильно надати невідкладну допомогу?

- A** *Знеболення, шина Дітерікса
- B** Давляча пов'язка, знеболення
- C** Шина Белера, знеболення
- D** Знеболення, шина Еланського
- E** Шина Крамера, знеболення

37

Яке найбільш небезпечне ускладнення може виникнути при кровотечі з яремних вен шиї?

- A** *Повітряна емболія
- B** Травматичний шок
- C** Велика крововтрата
- D** Падіння артеріального тиску
- E** Виникнення тромбів

38

Яка невідкладна допомога при защемленій грижі?

- A** *Холод на живіт, термінова госпіталізація
- B** Знеболення
- C** Носіння бандажу
- D** Вправлення грижі
- E** Введенні спазмолітиків

39

З чого починати надання невідкладної допомоги при закритому переломі?

- A** *Знеболення
- B** Туге бинтування
- C** Транспортна іммобілізація
- D** Введення спазмолітиків
- E** Введення антибіотиків

40

Потерпілий Н. 32 років отримав електротравму. Відсутні пульс на сонних артеріях та самостійне дихання, зіниці розширені. З чого медична сестра почне невідкладну допомогу?

- A** * Потрійного прийому Сафара.
- B** ШВЛ за методом з рота до рота.
- C** Непрямого масажу серця.
- D** Проведення дефібриляції.
- E** Висовування вперед нижньої щелепи

41

В урологічне відділення поступив хворий з діагнозом: напад ниркової кольки. Яке незалежне сестринське втручання може виконати медична сестра?

- A** *Тепла грілка на поперекову ділянку
- B** Зігрівальний компрес на поперекову ділянку
- C** Міхур з льодом на поперекову ділянку
- D** Ніжні гарячі ванни
- E** Міхур з льодом на низ живота

42

Ви медична сестра реанімаційного відділення. Під час догляду за пацієнтом К. 35 років ви виявили відсутність пульсу на променевій, та сонній артеріях. Скорочення серця припинилося хвилину тому. Який невідкладний стан у хворого?

- A** *Клінічна смерть
- B** Соціальна смерть
- C** Біологічна смерть
- D** Шок
- E** Колапс

43

Робітник підприємства одержав електротравму, тримає дріт в руці. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра:

- A** *Звільнити потерпілого від джерела електроструму
- B** Ввести знеболюючі препарати
- C** Провести штучну вентиляцію легенів
- D** Провести закритий масаж серця
- E** Викликати бригаду швидкої медичної допомоги

44

Ви стали свідком як пацієнтка К. 32 років під час прийому їжі раптом скрикнула. Об'єктивно: вираз обличчя переляканий, крила носа надуті, шкіра бліда з ціанотичним відтінком, помітне втягнення міжреберних проміжків. Яку невідкладну допомогу слід терміново надати?

- A** *Застосувати прийоми Геймліха
- B** Проводити оксигенотерапію без піногасника
- C** Проводити оксигенотерапію з піногасником
- D** Розстібнути комірець
- E** Ввести 2,4% розчин еуфіліну в/венно

45

Ви оглядаєте потерпілого з вогнепальною раною правого стегна. Локально: в рані видно осколки стегнової кістки, рана кровоточить пульсуючим струменем. Ваші першочергові дії?

- A** *Накласти джгут
- B** Накласти асептичну пов'язку
- C** Ввести знеболюючі
- D** Транспортувати потерпілого в найближчу лікарню
- E** Провести транспортну іммобілізацію підручними засобами

46

Який спосіб зупинки кровотечі ви застосуєте при травмуванні варикозно-розширеного вузла?

- A** * Тиснучу пов'язку
- B** Накладання джгута
- C** Максимальне згинання у суглобі
- D** Пальцеве притиснення судини
- E** Підвищене положення кінцівки

47

При огляді пацієнта 75 років. Свідомість та всі рефлексивні відсутні. Ознаки діяльності серцево-судинної та дихальної системи не визначаються. Виявлено залякання м'язів, трупні плями. Розм'якшення очного яблука, сухість та помутніння рогівки. Який ймовірний діагноз?

- A** * Біологічна смерть
- B** Клінічна смерть

- C* Агонія
- D* Термінальна пауза
- E* Передагонія

48

У чоловіка 70 років Ви діагностували гостру затримку сечі. Виберіть першочергові дії медичної сестри при наданні невідкладної допомоги хворому.

- A* *Катетеризація гумовим катетером.
- B* Катетеризація металевим катетером.
- C* Надлобкова пункція сечового міхура.
- D* Епіцистостомія.
- E* Аденомектомія.

49

На травмпункт доставлений чоловік 28 років. Сам сказати нічого не може, рот широко відкритий, нижня щелепа висунута вперед. Відмічається слинотеча. Травму отримав під час бійки. Який найбільш вірогідний діагноз?

- A* *Вивих нижньої щелепи.
- B* Перелом нижньої щелепи.
- C* Перелом верхньої щелепи.
- D* Остеомієліт нижньої щелепи.
- E* Остеома нижньої щелепи.

50

Чоловік 45 років звернувся за медичною допомогою. Скаржиться на біль правій паховій ділянці, який з'явився раптово після фізичного навантаження. Рік тому у хворого діагностовано правобічну пахову килу. При огляді у правій паховій ділянці є різкоболюче випинання, яке невправляється в черевну порожнину. Яке ускладнення виникло у хворого?

- A* *Защемлення пахової кили
- B* Запалення килкових оболонок
- C* Гострий апендицит
- D* Евентрація
- E* Копростаз

51

Потерпілий внаслідок автокатастрофи без свідомості, шкірні покриви бліді. Пульс на сонних артеріях відсутній, зіниці розширені, реакція на світло відсутня. Самостійне дихання відсутнє. Початковий діагноз є :

- A* * Клінічна смерть
- B* Біологічна смерть
- C* Соціальна смерть
- D* Коматозний стан
- E* Непритомний стан

52

Ви надаєте реанімаційну допомогу потерпілому внаслідок землетрусу, у якого діагностована "клінічна смерть". Назвіть I етап реанімації:

- A* *Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- B* Проведення штучної вентиляції легень
- C* Закритий масаж серця
- D* Транспортування в лікувальний заклад
- E* Дефібриляція

53

Під час проведення закритого масажу серця точка натискування знаходиться:

- A** *на межі нижньої та середньої третини грудини
- B** на межі верхньої та середньої третини грудини
- C** в V міжребір'ї по середньо ключичній лінії
- D** праворуч від грудини в II міжребір'ї
- E** на мечеподібному відростку

54

До якого основного обстеження треба підготувати пацієнта при підозрі на гостру кишкову непрохідність?

- A** *Рентгенологічне обстеження черевної порожнини
- B** Аналіз крові, сечі
- C** УЗД черевної порожнини
- D** Радіоізотопне черевної порожнини
- E** Колоноскопія, ректороманоскопія

55

Яку першу медичну допомогу надасть медсестра при закритій травмі живота з ушкодженням внутрішніх органів?

- A** *Холод на живіт, екстрена госпіталізація
- B** Фізіотерапевтичне лікування
- C** Грілку на живіт
- D** Знеболювання
- E** Підготовка до обстеження

56

В здоровпункті чоловіку 50 років встановлено діагноз: правостороння защемлена пахова грижа. Які дії медсестри є першочерговими на догоспітальному етапі.

- A** *Негайно викликати швидку допомогу, холод на живіт
- B** Дати но-шпу
- C** Дати анальгін
- D** Покласти холод на живіт
- E** Покласти грілку на живіт

57

У хірургічному відділенні пацієнту 50 років з виразковою хворобою шлунку, ускладненою кровотечею, проведено гемотрансфузію. Яке лабораторне обстеження необхідно планувати на наступний день?

- A** *Клінічний аналіз крові і сечі
- B** Аналіз крові на цукор
- C** Пробу за Зимницьким
- D** Коагулограму
- E** Аналіз крові на RW

58

В здоровпункт на ношах доставлено пацієнта 33 років, у якого 15 хвилин тому раптово з'явився "кинжальний" біль у животі. При огляді: шкіра бліда, АТ 80/60 мм рт.ст., Рс – 100/хв. При пальпації живіт дошкоподібний, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Сплануйте надання першої медичної допомоги?

- A** *Холод на живіт, негайна госпіталізація
- B** Ввести спазмолітики
- C** Амбулаторне спостереження
- D** Знеболювання
- E** Транспортування в гастроентерологічне відділення

59

Ви стали свідком електротравми. Потерпілий лежить на землі на лівому боці. Ви

встановили, що дихання у нього відсутнє, пульс не визначається. З чого Ви почнете проводити реанімаційні заходи?

- A** *Повернути потерпілого на спину, забезпечити прохідність дихальних шляхів;
- B** Повернете потерпілого на спину, почнете ритмічно натискувати на груднину;
- C** Повернете потерпілого на живіт, здійснюватимете натискання на лопаткові ділянки;
- D** Надасте потерпілому сидячого положення, розітрете скроні;
- E** Надасте потерпілому сидячого положення, здійснюватиме піднімання його рук.

60

Ви стали свідком дорожньо-транспортної аварії. Потерпілий лежить на дорозі. При огляді відсутні дихання і серцебиття, зіниці на світ не реагують. Коли треба розпочинати реанімаційні заходи?

- A** *Негайно
- B** Після прибуття бригади швидкої допомоги
- C** Після прибуття спеціалізованої реаніматологічної бригади
- D** При транспортуванні потерпілого
- E** В стаціонарі

61

Під час огляду у хворого почалась носова кровотеча. Яке втручання першочергово Ви повинні зробити з метою надання невідкладної допомоги?

- A** *Нахилити голову донизу
- B** Надати горизонтального положення
- C** Запрокинути голову доверху
- D** Провести гарячу ніжну ванну
- E** Провести задню тампонаду носа

62

У реанімаційному відділенні для стимуляції слиновиділення застосовують:

- A** * Лимонний сік
- B** Моркв'яний сік
- C** Яблучний сік
- D** Мінеральну воду
- E** Розчин фурациліну

63

Ефективність ШВЛ контролюють за наявності:

- A** * Екскурсій грудної клітки
- B** Тахікардії
- C** Рухової активності
- D** Свідомості
- E** М'язевого тонусу

64

Пацієнт 35 років внаслідок ДТП отримав травму обличчя та волосистої частини голови, при огляді виявлено кровотечу з правої лицевої артерії. Вкажіть місце пальцевого притиснення для зупинки кровотечі:

- A** *Під кутом нижньої щелепи справа
- B** Середина переднього краю кивального м'яза
- C** Над ключицею справа
- D** Сконева ділянка голови
- E** Ділянка перенісся

65

У пацієнта з гострим панкреатитом спостерігаються ознаки делірію: збудження, дезорієнтація в просторі, часі, власній особі, агресивність до оточуючих людей. Які

першочергові дії медичної сестри в даній ситуації?

- A** *Зафіксувати хворого до ліжка
- B** Заспокоїти хворого
- C** Ввести нейролептики
- D** Вивести хворого з відділення
- E** Зателефонувати родичам

66

У потерпілого шахтаря дві нижні кінцівки перебували під завалом 11 годин. На місці травми на стегна були накладені джгути. Які подальші дії медичної сестри при транспортуванні потерпілого в лікувальний заклад?

- A** * Джгути не знімати, ввести знеболюючі
- B** Зняти джгути, ввести знеболюючі
- C** Зняти джгути, обкласти кінцівки міхурами з льодом
- D** Джгути не знімати, дати кисень
- E** Зняти джгути, положити транспортні шини

67

Мужчина отримав відкритий перелом правої гомілки. Яка з перерахованих нижче проблем є дійсною пріоритетною в даному випадку?

- A** *Кровотеча
- B** Біль
- C** Набряк
- D** Порушення функції кінцівки
- E** Деформація кінцівки

68

Бригада швидкої медичної допомоги проводить комплекс серцево-легеневої реанімації потерпілому, ураженому електричним струмом. Яка ознака підтвердить розвиток біологічної смерті?

- A** *Помутніння рогівки
- B** Відсутність дихання
- C** Відсутність серцебиття
- D** Арефлексія
- E** Звуження зіниць

69

В яких випадках при пораненні живота дозволено вводити наркотики на догоспітальному етапі.

- A** Поранення з евітрацією внутрішніх органів
- B** Поранення селезінки
- C** Поранення печінки
- D** Поранення шлунку
- E** Поранення кишки

70

Хворого укусила бджола в праве плече і він звернувся до медсестри зі скаргами на набряк обличчя та свербіння в місці укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворому?

- A** * прикласти міхур до місця укуса, ввести супрастин в/м
- B** ввести 50% розчин анальгін
- C** обробити розчином йодонату
- D** накласти пов'язку з фурациліном
- E** прикласти грілку до місця укусу