

Крок М Сестринська справа
Невідкладні стани в терапії

1

У хворого астматичний статус. Який препарат Ви використаєте на долікарському етапі?

- A** *Преднізолон
- B** Дібазол
- C** Інсулін
- D** Пеніцилін
- E** Анальгін

2

У хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що Ви використаєте при наданні невідкладної допомоги?

- A** * Адреналін
- B** Анальгін
- C** Дібазол
- D** Но-шпу
- E** Дицинон

3

Медсестра під час проведення шлункового зондування тонким зондом помітила у шлунковому вмісті значну кількість крові. Які її першочергові дії?

- A** * Припинити зондування
- B** Продовжити зондування
- C** Зробити перерву
- D** Поставити грілку на живіт
- E** -

4

У хворого критичне зниження температури тіла, з'явилися ознаки гострої судинної недостатності. Яке залежне сестринське втручання виконаєте при наданні допомоги?

- A** * Ввести судинні засоби
- B** Покласти грілки до ніг
- C** Дати випити каву
- D** Підняти нижній кінець ліжка
- E** Забрати подушку з-під голови

5

Під час внутрішньовенного введення ліків у хворого з'явилися ознаки анафілактичного шоку. Надання допомоги необхідно розпочати з:

- A** * Накладання джгута на кінцівку
- B** Введення адреналіну підшкірно
- C** Подачі кисню
- D** Введення еуфіліну внутрішньовенно
- E** Введення преднізолону внутрішньовенно

6

У кардіологічне відділення терміново госпіталізований пацієнт з діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Йому проводиться комплекс інтенсивної терапії та догляду. При плануванні заходів медсестринської допомоги пацієнту Вашим першочерговим завданням буде:

- A** *Забезпечити повний фізичний та психічний спокій
- B** Забезпечити комплекс гігієнічних заходів догляду за шкірою
- C** Спостереження за пульсом, артеріальним тиском
- D** Годування пацієнта та догляду за порожниною рота
- E** Слідкувати за фізіологічними відправленнями

7

На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 33 років з приводу бронхіальної астми. Яке медсестринське втручання необхідно здійснити у разі нападу бронхіальної астми:

- A** * Заспокоїти пацієнта, застосувати інгаляційно сальбутамол
- B** Заспокоїти пацієнта, дати зволожений кисень
- C** Заспокоїти пацієнта, поставити міхур з льодом на грудну клітку
- D** Заспокоїти пацієнта, дати відхаркувальну мікстуру
- E** Заспокоїти пацієнта, провести лужну інгаляцію

8

На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 42 років з діагнозом: нирковокам'яна хвороба. У нього раптово виник напад ниркової кольки. Яким буде першочергове незалежне втручання, спрямоване на зменшення болю:

- A** * Дасте теплу грілку на поперекову ділянку
- B** Введете спазмолітики за призначенням
- C** Дасте випити гарячого чаю
- D** Запропонуєте інтенсивні рухові вправи
- E** Поставите міхур з льодом на поперекову ділянку

9

Пацієнту на цукровий діабет медсестра за призначенням лікаря ввела 24 одиниці інсуліну. Через 20 хв. він звернувся до неї зі скаргами на відчуття сильного голоду, тремтіння кінцівок і всього тіла. Шкіра бліда, вкрита холодним потом. Яку термінову допомогу потрібно надати пацієнту:

- A** * випити солодкого чаю
- B** укласти в ліжку, зігріти
- C** прийняти заспокійливі
- D** прийняти цукрознижуючі
- E** -

10

Пацієнт звернувся до сімейної медсестри зі скаргами на сильний біль голови у потилиці, шум у вухах. Такі напади спостерігаються після психічних навантажень. АТ коливається від 150/100 до 190/110 мм рт.ст. Розвиток якого синдрому спостерігається у хворого?

- A** * гіпертензивного
- B** гострої серцевої недостатності
- C** вінцевої недостатності
- D** гіпотензивного
- E** гострої судинної недостатності

11

Пацієнта доставлено в приймальне відділення без свідомості. Впродовж 8 років хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. На роботі втратив свідомість. Об'єктивно: Шкіра чиста, волога, гіпертонус м'язів. АТ-115/70 мм рт.ст. Яке ускладнення основного захворювання виникло у пацієнта?

- A** * Гіпоглікемічна кома
- B** Гіперосмолярна кома
- C** Молочнокисла кома
- D** Гіперглікемічна кома
- E** Церебральна кома

12

В маніпуляційному кабінеті після введення антибіотика внутрішньом'язово у пацієнта з'явилися шум в вухах, почуття задухи, втрата свідомості. Яке ускладнення запідозрить медична сестра?

- A** * Анафілактичний шок

- B** Непритомність
- C** Колапс
- D** Кардіогенний шок
- E** Токсико-інфекційний шок

13

У хворого 65-ти років на рак легенів виникла легенева кровотеча. Який з перерахованих препаратів слід ввести?

- A** *Амінокапронову кислоту
- B** Анальгін
- C** Адреналін
- D** Гемостимулін
- E** Вітамін В₁₂

14

Пацієнтка доставлена бригадою швидкої допомоги у терапевтичне відділення зі скаргами на блювання темно-коричневого кольору, дьогтеподібні випорожнення, біль у животі, серцебиття, загальну слабкість. Страждає на виразкову хворобу шлунка. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- A** *Шлункова кровотеча
- B** Легенева кровотеча
- C** Гемороїдальна кровотеча
- D** Стравохідна кровотеча
- E** Маткова кровотеча

15

Жінку укусила бджола в праве плече. Вона звернулася до медичної сестри зі скаргами на набряк, свербіння у місці укусу. Яку невідкладну допомогу треба надати хворій?

- A** * Накласти міхур з льодом
- B** Накласти пов'язку з фурациліном
- C** Ввести р-н анальгін
- D** Обробити розчином йоду
- E** Прикласти грілку до місця укусу

16

У хворої, яка страждає на гіпертиреоз, після психоемоційної травми з'явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла (41°C), тахікардія, АТ 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки?

- A** *Тиреотоксична криза
- B** Гіпертонічна криза
- C** Порушення мозкового кровообігу
- D** Напад серцевої астми
- E** Напад стенокардії

17

У пацієнта на гіпертонічну хворобу ввечері раптово підвищився артеріальний тиск. З'явився біль в ділянці серця і потилиці, миготіння "мушок" перед очима, нудота. Об'єктивно: АТ 260/100 мм рт.ст. Пульс – 120 в 1 хв., ритмічний. Обличчя гіперемійоване, шкіра волога. Яке ускладнення виникло?

- A** *Гіпертонічна криза
- B** Стенокардія
- C** Гостре порушення мозкового кровообігу
- D** Інфаркт міокарду
- E** Гостра лівошлункочкова недостатність

У пацієнтки на цукровий діабет з'явилась слабкість, зниження працездатності, погіршення апетиту, спрага, сонливість, шумне дихання Куссмауля, запах ацетону з рота. Через 2 доби втратила свідомість. АТ – 100/60 мм рт.ст. Пульс – 110 в 1 хв., ритмічний. Шкіра суха. Очні яблука м'які, зіниці звужені. Яке ускладнення виникло у хворої?

- A** * Гіперглікемічна кома
- B** Гіперсмолярна кома
- C** Гіпоглікемічна кома
- D** Уремична кома
- E** Печінкова кома

19

У пацієнта на гіпертонічну хворобу після стресу ввечері з'явилась різка слабкість, біль в ділянці серця з ірадіацією в ліве плече і руку впродовж 30 хвилин, не знімається нітроглицерином. Об'єктивно: блідий, АТ – 90/60 мм рт.ст. Пульс – 90 в 1 хв., аритмічний. Що запідозрить медична сестра?

- A** *Інфаркт міокарду
- B** Шок
- C** Колапс
- D** Серцеву астму
- E** Стенокардію

20

В гастроентерологічному відділенні у пацієнта на виразкову хворобу шлунка раптово вночі з'явився "кинджальний" біль у надчеревній ділянці. Об'єктивно: холодний липкий піт, блідість шкіри. Захисне напруження м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- A** *Перфорація
- B** Пенетрація
- C** Пілоростеноз
- D** Малігнізація
- E** Шлункова кровотеча

21

Під час прогулянки в полі чоловіка вкусила оса. Невдовзі він поскаржився на біль в гортані, охриплість голосу, утруднене дихання, нудоту. Об'єктивно: набряк губ, язика, мигдаликів, повік. Дихання шумне. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A** * Набряк Квінке
- B** Гострий риніт
- C** Анафілактичний шок
- D** Кропив'янка
- E** Астматичний статус

22

Пацієнт 53 років звернувся до дільничної медсестри зі скаргами на стискаючий біль за грудиною, який триває 4 - 5 хвилин та іррадіює в ліве плече, ліву руку. Який препарат застосовують з метою розширення коронарних артерій?

- A** *Нітроглицерин
- B** Нітроксолін
- C** Димедрол
- D** Омнопон
- E** Папаверин

23

Пациент, 42 года, жалуется на резкие боли за грудиной, которые иррадируют в левую руку. Приступ длится более 30 минут, применение нитроглицерина эффекта не дало. Для какого заболевания характерны такие проблемы пациента?

- A** * Инфаркт миокарда

- B** Приступ стенокардии
- C** Отек легких
- D** Гипертонический криз
- E** Порок сердца

24

Пациент, 34 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом – язвенная болезнь желудка. Жалуется на слабость, головокружение, рвоту “кофейной гущей”, дегтеобразный кал. Какое осложнение возникло у пациента?

- A** * Желудочно-кишечное кровотечение
- B** Перфорация язвы
- C** Пенетрация
- D** Малигнизация
- E** Стеноз привратника

25

Пациент, 22 года, находится на лечении в пульмонологическом отделении с диагнозом – бронхиальная астма. Возник приступ удушья с затрудненным выдохом, кашель со стекловидной мокротой. Какой препарат необходимо приготовить медсестре для оказания неотложной помощи?

- A** * Эуфиллин
- B** Кордиамин
- C** Анальгин
- D** Коффеин
- E** Дибазол

26

Медсестру пригласили к соседу, 54 года, страдает сахарным диабетом. Со слов родственников жаловался на слабость, чувство голода, дрожание тела, головокружение. Затем потерял сознание. Объективно: кожа бледная, влажная, тонус мышц повышен, дыхание поверхностное, глазные яблоки обычные, запаха ацетона нет. Какое состояние возникло у пациента?

- A** * Гипогликемическая кома
- B** Гипергликемическая кома
- C** Уремическая кома
- D** Печеночная кома
- E** Анафилактический шок

27

Больная К., 47 лет, находится на лечении с диагнозом – язвенная болезнь желудка. Внезапно возникла резкая “кинжальная” боль в эпигастриальной области, слабость, головокружение. Тактика медсестры в данной ситуации?

- A** * Вызвать врача
- B** Ввести анальгин
- C** Ввести спазмолитики
- D** Промыть желудок
- E** Дать теплое питье

28

Больной доставлен в приемное отделение без сознания, кожа и слизистые сухие, гиперемия щек, изо рта запах ацетона. В анамнезе – сахарный диабет. Какой препарат медсестра подготовит для введения?

- A** * Инсулин
- B** глюкоза 20%
- C** глюкоза 40%
- D** глюкагон
- E** строфантин

29

У пацієнта онкодиспансера спостерігається виділення під час кашлю червоної пінистої крові. Протягом останніх двох місяців погіршився апетит, з'явилася слабкість, знизилася маса тіла. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс – 100 уд. за хв., АТ – 80/50 мм рт.ст. В аналізі мокротиння виявлені атипові клітини. Яку долікарську допомогу необхідно надати пацієнту в першу чергу?

- A** *Покласти міхур з льодом на грудну клітку
- B** Покласти теплу грілку на грудну клітку
- C** Поставити гірчичники на стегно
- D** Провести оксигенотерапію
- E** -

30

У пацієнта після вживання меду з'явилися скарги на різке нездужання, утруднене дихання, осиплість голосу. Під час огляду: стан середньої тяжкості, свідомість збережена. шкірні покриви бліді, набряклі губи, повіки та язик. Пульс – 92 удари за хв., АТ – 110/70 мм рт.ст. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A** *Набряк Квінке
- B** Кропив'янка
- C** Сироваткова хвороба
- D** Напад бронхіальної астми
- E** Анафілактичний шок

31

У хворого після введення пеніциліну раптово з'явилися різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворого важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії медсестри?

- A** *Місце ін'єкції обколоти 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду
- B** Ввести еуфілін
- C** Ввести 20% розчин кофеїну
- D** Покласти грілку
- E** Ввести строфантин

32

Хвора скаржиться на інтенсивний тиснучий біль за грудиною, що триває 45 хв., слабкість, серцебиття, страх смерті. Об'єктивно: шкіра бліда, синюшність губ. Тони серця ослаблені, ритмічні. Пульс – 108 в 1 хв., АТ – 100/60 мм рт.ст. Яке захворювання запідозрить медсестра?

- A** *Гострий інфаркт міокарда
- B** Набряк легень
- C** Стенокардія
- D** Міокардит
- E** Сухий плеврит

33

У пацієнтки після введення протиправцевої сироватки через декілька хвилин з'явилась різка квалість, запаморочення, серцебиття, задишка. Пізніше втратила свідомість. Об'єктивно: виражена блідість шкіри та слизових, пітливість. PS – 110/хв., АТ 60/40мм рт.ст. Вкажіть причину погіршення стану пацієнтки?

- A** *Анафілактичний шок
- B** Астматичний статус
- C** Травматичний шок
- D** Геморагічний шок
- E** -

34

Пацієнтка скаржиться на поширену висипку на шкірі, яка супроводжується нестерпним свербіжем. Висипка з'явилась на другий день після щеплення протигрипозною вакциною. Об'єктивно: стан задовільний. На шкірі обличчя, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок – поширене уртикарне висипання, місцями зливного характеру, сліди від розчухів. Міхурі рожево-червоного кольору, підвищуються над рівнем шкіри. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- A** *Гостра кропив'янка
- B** Вітряна віспа
- C** Системний червоний вовчак
- D** Набряк Квінке
- E** Скарлатина

35

Пацієнт доставлений в лікарню у тяжкому стані, свідомість сплутана. Шкіра суха, запах ацетону в повітрі. Пульс 115/хв., ритмічний, АТ 95/65 мм рт.ст. Дихання шумне, типу Кусмауля. До якого найбільш інформативного методу дослідження підготує медична сестра пацієнта?

- A** *Визначення рівня глюкози в крові
- B** Визначення вазопресину в крові
- C** Визначення креатиніну в крові
- D** Визначення рівня білірубіну
- E** Визначення рівня рН крові

36

Хворий 55 років скаржиться на біль за грудиною після психічного навантаження. Встановлено діагноз стенокардія. Виберіть препарат надання невідкладної допомоги:

- A** *Нітрогліцерин
- B** Гепарин
- C** Вікасол
- D** Клофелін
- E** Преднізолон

37

Визначте невідкладну допомогу при перфорації виразки шлунку:

- A** *Міхур з льодом
- B** Антибіотики
- C** Кровоспинні засоби
- D** Постільний режим
- E** Введення наркотиків

38

У пацієнта 60 років з цукровим діабетом виникли такі симптоми: спрага, сонливість, запах ацетону з рота. Для надання невідкладної допомоги необхідно ввести:

- A** *Інсулін
- B** Глюкозу
- C** Папаверин
- D** Дібазол
- E** Димедрол

39

Під час відвідування вагітної на дому в терміні вагітності 34 тиж. патронажна медсестра встановила наявність незначних кров'янистих виділень зі статевих шляхів, які з'явилися раптового серед повного благополуччя. Які першочергові заходи повинна здійснити медсестра?

- A** *Викликати лікарську акушерську бригаду

- B** Покласти міхур з льодом на живіт
- C** Ввести розчин вікасолу
- D** Виміряти АТ
- E** Зробити тампонаду піхви

40

Під час нічного чергування медсестру покликали до хворої на цукровий діабет, яка втратила свідомість і розпочалися судоми. При огляді звертає на себе увагу профузна пітливість, тахікардія. Про який стан слід подумати медсестрі?

- A** *Гіпоглікемічна кома
- B** Кетоацидотична кома
- C** Гіперосмолярна кома
- D** Гіперлактатацидотична кома
- E** Тиреотоксична кома