

Крок М Лікувальна справа
Дисципліни терапевтичного профілю

1

До фельдшера ФАПУ звернулася хвора із скаргами на підвищену подразливість, поганий сон, зниження працездатності, пам'яті, апетиту, відчуття тривоги. Захворювання пов'язує з психічною травмою. Який найбільш імовірний діагноз?

- A** *Неврастенія
- B** Епілепсія
- C** Біполярний психоз
- D** Хвороба Альцгеймера
- E** Істерія

2

Оглядаючи жінку з терміном вагітності 26 тижнів, фельдшер ФАПУ діагностував початок передчасних пологів. З метою профілактики дистрес-синдрому він введе:

- A** *Внутрішньом'язово дексаметазон 6 мг
- B** Внутрішньовенно гініпрал
- C** Сублінгвально ніфідипін
- D** Внутрішньом'язово дексаметазон 24 мг
- E** Окситоцин 5 Од та 500 мл 0,9% натрію хлориду

3

Хвора Н., 40 р., на прийомі у фельдшера раптово втратила свідомість, упала. З'явилися тонічні, а потім клонічні судоми. Із рота виділяється піна з розовим відтінком. Відмічено мимовільне сечовиділення. Яку невідкладну допомогу необхідно надати хворій?

- A** *Притримати хвору за голову і кінцівки, повернути голову набік
- B** Ввести магнію сульфат
- C** Викликати лікаря
- D** Виміряти артеріальний тиск
- E** Ввести серцеві засоби

4

Фельдшер ШМД оглядає постраждалого на місці ДТП. Пацієнт скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення, одноразове блювання. Зі слів дружини, був непритомний кілька хвилин. Який попередній діагноз?

- A** *Струс головного мозку
- B** Забій головного мозку
- C** Синкопальний синдром
- D** Психоемоційний стрес
- E** Вегетативний криз

5

Фельдшер здоровпункту повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

- A** *Постійний
- B** Змінний
- C** Імпульсний
- D** Модульований
- E** Високочастотний